MARCOS ANTONIO LIMA MATOSO

ASSOCIAÇÕES DE CAMARÕES ESCAVADORES (AXIIDEA E GEBIIDEA) DE
PRAIAS ADJACENTES A UM ESTUÁRIO TROPICAL E SUA RELAÇÃO COM A
HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E LARVAS PLANCTÔNICAS

Recife

2022

MARCOS ANTONIO LIMA MATOSO

**ASSOCIAÇÕES DE CAMARÕES ESCAVADORES (AXIIDEA E GEBIIDEA) DE
PRAIAS ADJACENTES A UM ESTUÁRIO TROPICAL E SUA RELAÇÃO COM A
HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E LARVAS PLANCTÔNICAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade (PPGBio) da Universidade Federal Rural de Pernambuco, como parte dos requisitos para obtenção de título de Mestre em Biodiversidade.

Orientador: Prof. Dr. Mauro de Melo Júnior - PPGBio/UFRPE

Coorientadora: Prof.^a Dr.^a Mônica Lúcia Botter-Carvalho – PPGBio/UFRPE

Recife

2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sistema Integrado de Bibliotecas
Gerada automaticamente, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

- M433a Matoso, Marcos Antonio Lima
ASSOCIAÇÕES DE CAMARÕES ESCAVADORES (AXIIDEA E GEBIIDEA) DE PRAIAS ADJACENTES A UM ESTUÁRIO TROPICAL E SUA RELAÇÃO COM A HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E LARVAS PLANCTÔNICAS / Marcos Antonio Lima Matoso. - 2022.
74 f. : il.
- Orientador: Mauro de Melo Junior.
Coorientadora: Monica Lucia Botter Botter-Carvalho.
Inclui referências.
- Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Recife, 2023.
1. Talassinidea. 2. Paulista. 3. rio Timbó. 4. Estuário. 5. zooplâncton. I. Junior, Mauro de Melo, orient. II. Botter Carvalho, Monica Lucia Botter, coorient. III. Título

MARCOS ANTONIO LIMA MATOSO

ASSOCIAÇÕES DE CAMARÕES ESCAVADORES (AXIIDEA E GEBIIDEA) DE
PRAIAS ADJACENTES A UM ESTUÁRIO TROPICAL E SUA RELAÇÃO COM A
HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E LARVAS PLANCTÔNICAS

Aprovada em: __/__/____

BANCA EXAMINADORA:

Orientador: _____

Dr. Mauro de Melo Júnior
(Titular/UFRPE)

Examinadores: _____

Dr.^a Jussara Moretto Martinelli-Lemos
(Titular externo/UFPA)

Dr. Flávio de Almeida Alves-Júnior
(Titular externo/UNIBRA)

Dr. Pedro Augusto Mendes Melo
(Suplente externo/UFPE)

Dr.^a Ana Carla Asfora El-Deir
(Suplente interno/UFRPE)

Recife
2022

Dedico este trabalho a Deus, à minha mãe, Elivany Matoso (*in memoriam*), ao meu pai, Marcos Matoso e às minhas irmãs. Pelo amor, educação, amizade e apoio de sempre.

*“Eis
o vasto e espaçoso mar, no qual se movem
inúmeras criaturas, seres grandes e
pequenos.”*

Salmos 104:25

AGRADECIMENTOS

Foram tempos bastante difíceis: Uma Pós-graduação “gerada” bem no início de uma pandemia. Então, o que já era desafiador, tornou-se ainda maior. Porém, mesmo em meio a tantas incertezas, pude contar com pessoas e personagens imprescindíveis para que eu conseguisse chegar até aqui. De coração, sou grato!

Agradeço primeiramente a Deus, por tamanha misericórdia, graça e bondade em me manter até aqui e nunca me deixar desistir, mesmo quando parecia impossível. Obrigado, Deus, pelo Teu amor incondicional.

À Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade (PPGBio/UFRPE), pela formação e por oferecer ensino gratuito e de qualidade.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa de mestrado e pelo auxílio do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP), cuja verba foi indispensável para realizar a etapa de campo do presente trabalho.

Aos Membros da banca, pelas críticas e sugestões e contribuições.

Ao meu orientador Prof. Dr. Mauro de Melo Júnior e a minha Coorientadora Prof.^a Dr.^a Mônica Botter por terem me aceitado como orientando, pelos ensinamentos, pela paciência, pelo incentivo e por serem verdadeiros referenciais pra minha vida.

Aos laboratórios da UFRPE-Sede: Laboratório de Ecologia de Peixes (LEP), Laboratório de Ecologia Reprodutiva de Angiospermas (LERA), Laboratório de Tecnologia de Bioativos (LABTECBIO), e seus respectivos coordenadores, por cederem espaço e material para realizar parte dos processamentos das amostras. Principalmente à Prof.^a Dr.^a (e Diretora do Departamento de Biologia) Elisângela Bezerra, por, mesmo em meio às restrições durante a pandemia, me permitiu usar o laboratório (LERA), praticamente em tempo integral.

À equipe do Laboratório de Ecologia do Bentos Costeiro (LEBENC), do qual faço parte desde a graduação; especialmente a Swane e a Wyllyane, nossa, como vocês foram/são importantes. Obrigado por toda ajuda e pela amizade!

À equipe do Laboratório de Ecologia do Plâncton (LEPLANC), que me acolheu durante a Pós-Graduação. Em especial a Jéssika por me auxiliar a dar os primeiros passos no mundo do zooplâncton. A Felipe, Lucas Nunes, Marcella, José, Dani e Mylena, pela parceria, pela troca, pelos momentos de descontração. Vocês tornavam os dias mais leves.

Aos funcionários da UFRPE, em especial aos motoristas, sempre muito responsáveis e solícitos durante às viagens para a coleta de campo.

Aos barqueiros Sr. Bené e Sr. Carlos, por todo apoio e ajuda durante as coletas.

À equipe que se dispôs a me ajudar, de alguma maneira durante as coletas: Minha irmã Monique, meu cunhado Alexei (Xixo), meu companheiro Ailton e aos meus amigos Ezildo, José (Tito), Túlio, Yago e Guilherme. Sem a ajuda de vocês eu não conseguiria. Obrigado por tamanha boa vontade.

Aos meus amigos Lucas Santos, Beatriz de Aquino e Joesili Oliveira por momentos únicos. Pelos conselhos, pelo apoio, pelo incentivo. Por Tudo que vocês são e representam pra mim. Verdadeiros presentes que a UFRPE me deu.

À minha família: minha mãe, que tá lá no céu e tenho certeza de que tá torcendo por mim. (“Mãe, ainda não está fácil sem a senhora por aqui. Mas sigo tentando, e muito disso é pela senhora. Espero que estejas orgulhosa!”), ao meu Pai, pelo sustento e investimento e por, na medida do possível, não me deixar faltar nada. Às minhas irmãs Marta e Monique, por todo amor e carinho, pelo cuidado, torcida e por acreditarem em mim. Aos meus sobrinhos Lílian e Gael, por ocuparem minha mente e me distraírem, e ao mesmo tempo, me fazer voltar pra mim sempre que oportuno. Ao meu companheiro Ailton, por me aguentar nos momentos mais difíceis... pelos chocolates pra me acalmar, pelo companheirismo e compreensão. A Harry, meu cachorro (filho), por mudar minha rotina e trazer uma dose extra de amor e fofura na minha vida. Ao meu irmão, não de sangue, mas de coração, Ezildo, um dos meus melhores amigos, há tanta coisa... só te agradeço por tudo.

Por fim, agradeço a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para que eu vencesse cada etapa e conseguisse chegar até aqui. Obrigado!

Lista de Figuras

- Figura 1: Área do estudo: Complexo marinho-estuarino, localizado no litoral norte de Pernambuco, entre os municípios de Paulista e Igarassu, com os símbolos apresentando as estações de coleta do zooplâncton.: porção sul (PS); pluma estuarina (PE) e porção norte (PN). A Área destacada corresponde à praia de Mangue Seco, local onde foram coletadas as fêmeas ovígeras..... 60
- Figura 2: Valores médios dos parâmetros abióticos (pH, temperatura e salinidade) obtidos durante as coletas na porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de seca (s) e chuvosa (c), com seus respectivos desvios padrão. 61
- Figura 3: Ordenação PCA envolvendo as variáveis ambientais (temperatura, salinidade, pH) com os locais de coleta porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e com os eventos de amostragem seca (s) e chuvosa (c). 61
- Figura 4: Larvas dos camarões escavadores coletadas no estágio de zoea 1. a - *Callichirus corruptus*. b - *Lepidophthalmus siriboia*, c - *Neocallichirus* sp., d - *Axianassa Australis* e e - *Upogebia* sp. 62
- Figura 5: Ordenação multidimensional não-métrica (MDS) com as densidades médias de larvas de Axiidea e Gebiidea em relação com os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de seca (s) e chuvosa (c). 62
- Figura 6: Densidade média (ind./100m³) do zooplâncton e seus desvios padrão. a – Densidade média total para todo zooplâncton coletado. b – Comparação da densidade média das larvas dos camarões escavadores entre os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de seca (s) e chuvosa (c)..... 63
- Figura 7: Comparação da abundância relativa larval das espécies de camarões escavadores entre as locais de coleta porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de seca (s) e chuvosa (c)..... 64

Figura 8: Classificação dos taxa encontradas quanto à frequência de ocorrência (FrO %), seguindo o critério estabelecido onde $FrO > 70\%$ - Muito frequente; $70 \text{ } \vdash \text{ } 40\%$ -Frequente $40 \text{ } \vdash \text{ } 20\%$ - Pouco frequente (PA) e $\leq 20\%$ - Raro.	64
Figura 9: Representação da frequência de ocorrência (FrO %) dos os estágios larvais dos camarões escavadores entre os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE), e entre os eventos de amostragem: seca (s) e chuvosa (c).	65
Figura 10: Contribuição do zooplâncton coletado para a biomassa total dos organismos, estimada através do peso úmido e expressa em $mg/100m^3$	66
Figura 11: Contribuição das larvas dos camarões escavadores com a biomassa ($mg/100m^3$) local de Coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE), e entre os eventos de amostragem: seca (s) e chuvosa (c)..	67

Lista de Tabelas

Tabela I: Dados hidrológicos do pH, Temperatura e Salinidade em cada estação de coleta, com o valor da média e desvio padrão amostral, onde porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e DP = Desvio Padrão.).....	67
Tabela II: Resultados da análise de componentes principais (PCA) das variáveis ambientais (pH, temperatura e salinidade) medidas das estações de coleta em estudo e suas respectivas contribuições em percentagem.	68
Tabela III: Composição taxonômica e abundância relativa (AR-%) do zooplâncton entre as estações de coleta, PS = porção sul; PN = porção norte e PE = pluma estuarina. E entre eventos amostrais: s = seco, c = chuvoso; estágio de desenvolvimento larval para as Famílias Callichiridae e Upogebiidae e Axianassidae, de maneira que Zoea 1 (Z1) e Zoea 2 (Z2), e suas respectivas classificações quanto a abundância, onde > 70% - Dominantes (DO); 70 - 40% - Abundantes (AB); 40 - 20% - Pouco abundante (PA) e ≤ 20% - Raro (RA).	69
Tabela IV: Análise PERMANOVA a 2 fatores utilizando a densidade larval de Axiidea e Gebiidea. Fatores fixos: estações de coleta (porção sul, porção norte e pluma estuarina) e, Período (seco e chuvoso). A análise foi baseada na matriz de similaridade de Bray Curtis, transformada em Log(x+1).	70
Tabela V: Contribuição percentual (%) das espécies das larvas dos camarões escavadores para a similaridade (análise de SIMPER) dentro de cada grupo formado pelas estações de coleta (PN= porção norte; PS= porção sul e PE= pluma estuarina).	71
Tabela VI: Contribuição percentual (%) das espécies das larvas dos camarões escavadores para a similaridade (análise de SIMPER) entre os eventos de amostragem de seca e chuvosa.....	72
Tabela VII: Registro dos grupos dos taxa de camarões escavadores coletados durante o período de estudo na praia de Mangue Seco, Igarassu. AR = Abundância relativa (%); FrO = Frequência de ocorrência (%) e Class. = Classificação de ocorrência, onde: FrO > 70% - Muito frequente (MF); 70 - 40% -Frequente (F); 40 - 20% - Pouco frequente (PF) e ≤ 20% - Raro (R).	73

Tabela VIII: Registro das fêmeas ovígeras coletadas na praia de Mangue Seco, durante os eventos de amostragem. 74

SUMÁRIO

RESUMO	16
ABSTRACT	17
REFERENCIAL TEÓRICO	18
HIPÓTESES.....	19
OBJETIVO GERAL	20
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	20
REFERÊNCIAS.....	20
Manuscrito.....	24
Resumo.....	24
1.....	-
INTRODUÇÃO	26
2 – MATERIAL E MÉTODOS	29
<i>2.1 Caracterização da área de Estudo.....</i>	<i>29</i>
<i>2.2 Estratégia amostral e Procedimentos de campo</i>	<i>29</i>
2.2.2 Coleta do zooplâncton.....	30
2.2.3 Bentos	30
2.2.4 Coleta dos indivíduos adultos.....	31
<i>2.3 Mensuração e coleta dos parâmetros ambientais.....</i>	<i>31</i>

2.4 Procedimentos de laboratório.....	31
2.4.1 Da análise e triagem do zooplâncton.....	31
2.4.2 Dos camarões escavadores adultos.....	32
2.5 Tratamento numérico dos dados.....	32
2.5.1 Zooplâncton.....	32
2.5.2 Bentos.....	34
2.6 Análise dos dados.....	34
2.6.1 Zooplâncton.....	34
3 - RESULTADOS.....	35
3.1 Parâmetros ambientais:.....	35
3.2 Zooplâncton e estágios larvais dos camarões escavadores.....	36
3.2.1 Composição e densidade.....	36
3.2.2 – Abundância relativa, frequência de ocorrência e biomassa.....	38
3.3 – Camarões Escavadores.....	41
4 – DISCUSSÃO.....	42
4.1 – Parâmetros ambientais.....	42
4.2 – Fases larvais dos camarões escavadores e fêmeas ovígeras.....	43
4.3 – Zooplâncton e descritores ecológicos.....	45
4.4 – Contribuição larval dos camarões escavadores e fatores ambientais.....	47
5 - CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES.....	50
6 - AGRADECIMENTOS.....	50
7 – REFERÊNCIAS.....	50

Figuras:Erro! Indicador não definido.

Tabelas:.....Erro! Indicador não definido.

MATOSO, Marcos Antonio Lima (MSc). Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Agosto, 2022. ASSOCIAÇÕES DE CAMARÕES ESCAVADORES (AXIIDEA E GEBIIDEA) DE PRAIAS ADJACENTES A UM ESTUÁRIO TROPICAL E SUA RELAÇÃO COM A HETEROGENEIDADE AMBIENTAL E LARVAS PLANCTÔNICAS. Orientador: Prof. Dr. Mauro de Melo Júnior (UFRPE) e co-orientadora: Prof.^a Dr.^a Mônica Lúcia Botter-Carvalho.

RESUMO

O presente trabalho teve o objetivo de analisar o zooplâncton com ênfase na ocorrência das larvas dos camarões escavadores entre águas mais costeiras e águas de uma pluma estuarina, durante eventos de estiagem (seca) e chuvas. A ocorrência larval foi testada com relação aos parâmetros ambientais (temperatura, pH e salinidade) e com a ocorrência de fêmeas ovígeras. Para isto, foi produzido um manuscrito em que a área do estudo compreendeu um sistema marinho-estuarino, localizado entre os municípios de Paulista e Igarassu, litoral norte de Pernambuco. Tomando como referência a pluma estuarina do Rio Timbó, as amostras de zooplâncton foram realizadas, utilizando uma rede de arrasto com abertura de malha de 300 µm. A amostragem foi feita em em três locais de coleta 1-pluma estuarina, 2- águas da porção norte em relação a pluma e 3 – águas da porção sul. As variáveis ambientais da água em cada estação também foram mensuradas. Os indivíduos adultos foram coletados, com auxílio de bomba de sucção manual, na praia de Mangue Seco, área adjacente à pluma. Um teste PERMANOVA foi aplicado para verificar a ocorrência de diferenças significativas entre a densidade larval, os locais de coleta e os eventos de amostragem. Dentre os *taxa* encontrados no zooplâncton, foram identificadas *Axianassa australis*, *Upogebia* sp., *Callichirus corruptus*, *Lepidophthalmus siriboia* e *Neocallichirus* sp. não foi possível identificar diferenças significativas na densidade larval e os fatores observados. Larvas da espécie *Axianassa australis* foram as mais representativas durante todo estudo, demonstrado assim que os camarões escavadores de origem estuarina contribuem mais na comunidade zooplanctônica costeira. Houve coincidência entre as ocorrências das espécies larvais e das fêmeas ovígeras. Porém o indivíduo adulto de *A. australis* não foi coletado, sugerindo que a ausência dos adultos é ocasionada devido a incompatibilidade ambiental. Assim, o estudo fornece informações relevantes à ecologia e contribuição larval dos camarões escavadores no ambiente natural.

Palavras-Chave: Thalassinidea, Paulista, rio Timbó, estuário, zooplâncton

MATOSO, Marcos Antonio Lima (MSc). Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). August, 2022. ASSOCIATIONS OF BURROWING SHRIMPS (AXIIDEA AND GEBIIDEA) FROM BEACHES ADJACENT TO A TROPICAL ESTUARY AND THEIR RELATIONSHIP WITH ENVIRONMENTAL HETEROGENEITY AND PLANKTONIC LARVAE. Advisor: Dr. Mauro de Melo Júnior (UFRPE) and Dr. ^a Mônica Lúcia Botter-Carvalho.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze zooplankton with emphasis on the occurrence of burrowing shrimp larvae between more coastal waters and waters of an estuarine plume, during drought (dry) and rainfall events and between environmental parameters (temperature, pH and salinity) and relate to the occurrence of ovigerous females. For this, a manuscript was produced in which the study area comprised a marine-estuarine system, located between the municipalities of Paulista and Igarassu, north coast of Pernambuco. Taking the estuarine plume of the Timbó river as a reference, zooplankton samples were collected at three sampling stations: 1-estuarine plume, 2- waters from the northern portion in relation to the plume and 3- waters from the southern portion. The environmental variables of the water in each station were also measured. Adult individuals were collected at Mangue Seco beach, adjacent to the plume. Organisms were identified and quantified. A PERMANOVA test was applied to verify the occurrence of significant differences between larval density, collection stations and sampling events. Among the taxa found in zooplankton, *Axianassa australis*, *Upogebia* sp., *Callichirus corruptus*, *Lepidophthalmus siriboia* and *Neocallichirus* sp. were identified. It was not possible to identify significant differences in larval density and observed factors. Larvae of the species *Axianassa australis* were the most representative throughout the study, thus demonstrating that burrowing shrimp of estuarine origin contribute more to the coastal zooplankton community. There was coincidence between the occurrences of larval species and ovigerous females. However, the adult individual of *A. australis* was not collected, suggesting that the absence of adults is caused by environmental incompatibility. Thus, the study provides information relevant to the ecology and larval contribution of burrowing shrimp in the natural environment.

Keywords: Thalassinideans, Paulista, river Timbó, estuary, zooplankton

REFERENCIAL TEÓRICO

Os ambientes costeiros são considerados como regiões de transição extremamente dinâmicos (ÂNGULO, 2004). Esses ambientes são bastante relevantes no que diz respeito ao seu aspecto ecológico que pode ser evidenciado principalmente pelo mosaico de ecossistema que apresenta, com grande capacidade de comportar elevada biodiversidade. E apesar de sua heterogeneidade apresenta ambientes sensíveis e frágeis do ponto de vista ecossistêmico, como por exemplo os estuários, a região marinha costeira, dentre outros (MEUEHE, 1998).

Ecologicamente, os estuários e o ambiente marinho são considerados locais atrativos para inúmeras espécies, sejam elas residentes, dependentes, facultativas ou ocasionais (VIEIRA et al., 1998; McLUSKY e ELLIOTT, 2004). Também são importantes para o desenvolvimento de diversos grupos, muitas vezes de interesse econômico, como por exemplo crustáceos (SCHWAMBORN et al., 2008) e peixes (CHAO et al., 1982; GIARRIZZO e KRUMME, 2009) entre outros.

As diversas espécies presentes nesses ambientes, comumente, têm sua distribuição influenciada pela variação nos fatores ambientais, como por exemplo, salinidade, temperatura, pH, disponibilidade de alimento, turbidez e hidrodinâmica das correntezas e marés (ANGER, 2001; MAGRIS e LOUREIRO-FERNANDES, 2011). As variações nas condições ambientais podem acontecer de maneira sazonal, regional e/ou local (KAISER et al., 2006), regendo assim a dinâmica de dispersão e recrutamento das larvas existentes (EPIFANIO et al., 1988).

Em decápodes, a maioria dos seus estágios iniciais de vida encontra-se no zooplâncton em formato de larvas meroplactônicas, de maneira que logo após tornarem-se adultos, saem do ambiente planctônico para o bentônico (FERNANDES e BONECKER, 2006). As fases larvais podem ser encontradas de maneira contínua na coluna d'água, enfrentando as diferentes condições ambientais (ANGER, 2001) e em períodos reprodutivos, podem chegar a ser dominantes dentro da comunidade zooplanctônica (BOSCHI, 1981).

Os camarões escavadores das infraordens Axiidea e Gebiidea, organismos alvo do presente estudo, são exemplos de decápodes de hábito bentônico na fase adulta, com liberação larval no ambiente planctônico após a eclosão dos ovos (PHOLE et al., 2014). Estes animais, possuem vários de seus representantes comuns de regiões estuarinas

(DÍAZ-FERGUSON e VARGAS-ZAMORA, 2001), como por exemplo *Axinanassa australis* (FELDER, 2001) e *Upogebia vasquezii* (DE OLIVEIRA et al., 2012), e após a reprodução, completam o desenvolvimento larval em águas costeiras (MAGRIS e LOUREIRO FERNANDES, 2005). Outras espécies também são típicas de praias arenosas costeiras, como por exemplo *Callichirus corruptus*, chegando a ser dominantes na região do médio litoral (BOTTER-CARVALHO et al., 2007).

A distribuição tanto dos organismos adultos como das fases larvais, exceto na fase de megalopa, quando está próxima de se assentar, depende de alguns aspectos em relação ao ambiente de origem da espécie (marinho ou estuarino), e leva em consideração a variação dos fatores ambientais (bióticos e abióticos) e dos mecanismos de dispersão larvais adotados, sejam eles de exportação ou retenção, que leva em consideração se o ambiente possui condições favoráveis para o sucesso do desenvolvimento larval, como, por exemplo, a influência da temperatura e salinidade (WOOLDRIDGE e LOUBUSER, 1996; GEBAUER et al., 2010; MAGRIS et al., 2011).

No mundo, há pouco conhecimento sobre a dinâmica das larvas dos camarões escavadores no seu ambiente natural (Phole et al., 2014), principalmente em regiões tropicais, local de maior número de espécies desse grupo. Tais informações são fundamentais para o conhecimento da história de vida desses animais. Assim como para a grande maioria dos invertebrados marinhos, conhecer a ecologia e o comportamento dos estágios larvais dos camarões escavadores é importante para entender os processos que influenciam a ecologia dos indivíduos adultos. Sendo assim é de grande relevância avaliar os padrões de dispersão desses organismos através dos mecanismos de dispersão planctônica (OLSON e OLSON, 1989).

HIPÓTESES

i - Há sincronia na ocorrência de fêmeas ovígeras e larvas planctônicas dos camarões-escavadores em eventos de amostragem de estiagem (seca) e de chuvas.

ii – Camarões escavadores estuarinos contribuem mais com larvas para o plâncton marinho costeiro que os camarões escavadores das praias não-estuarinas.

OBJETIVO GERAL

Analisar o zooplâncton com ênfase na ocorrência das larvas dos camarões escavadores entre águas mais costeiras e águas de uma pluma estuarina, durante eventos de estiagem (seca) e chuvas e entre os parâmetros ambientais (temperatura, pH e salinidade) e relacionar com a ocorrência de fêmeas ovígeras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Identificar as larvas dos camarões escavadores até o menor nível taxonômico e verificar se há relação entre sua densidade em um gradiente ambiental (águas costeiras x pluma estuarina) e com os fatores abióticos (temperatura, pH e salinidade);

II. Descrever a composição zooplanctônica com ênfase nas larvas dos camarões escavadores e quantificar sua contribuição em termos de abundância, frequência de ocorrência e biomassa;

III. Identificar se há coincidência na ocorrência das larvas planctônicas dos camarões escavadores com o período de ocorrência das fêmeas ovígeras na praia adjacente.

IV. Avaliar a ocorrência de fêmeas ovígeras de camarões escavadores em uma praia com influência estuarina (Mangue Seco), nos eventos de amostragem seco e chuvoso.

REFERÊNCIAS

ANGER, Klaus. The biology of decapod crustacean larvae. Lisse: **AA Balkema Publishers**, 2001.

ANGULO, Rodolfo José. Aspectos físicos das dinâmicas de ambientes costeiros, seus usos e conflitos. **Desenvolvimento e meio ambiente**, 10, 2004.

BOSCHI, E. E. Larvas de Crustacea Decapoda. **Atlas del zooplancton del Atlantico Sudoccidental**, 699-758, 1981.

BOTTER-CARVALHO, M. L.; SANTOS, PJP dos; CARVALHO, PVV da C. Population dynamics of *Callichirus major* (Say, 1818) (Crustacea, Thalassinidea) on a beach in northeastern Brazil. **Estuarine, Coastal and Shelf Science**, 71 (3-4): 508-516, 2007.

- CHAO, L.N.; PEREIRA, L.E.; VIEIRA, J.P. Estuarine fish community of the Patos Lagoon, Brazil. **Fish community ecology in estuaries and coastal lagoons: towards an ecosystem integration**. México: UNAM. 20: 429-450, 1985.
- DE OLIVEIRA, D. B; SILVA, D. C.; MARTINELLI, J. Density of larval and adult forms of the burrowing crustaceans *Lepidophthalmus siriboia* (Callinassidae) and *Upogebia vasquezii* (Upogebiidae) in an Amazon estuary, northern Brazil. **Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom**, 92(2): 295-303, 2012.
- DÍAZ-FERGUSON, E; VARGAS-ZAMORA, J. A. Abundance of *Petrolisthes armatus* (Crustacea: Porcellanidae) on a tropical estuarine intertidal rocky beach, Gulf of Nicoya estuary, Costa Rica. **Revista de Biología Tropical**, p. 97-101, 2001.
- EPIFANIO, C. E.; LITTLE, K. T.; ROWE, P. M. Dispersal and recruitment of fiddler crab larvae in the Delaware River estuary. **Marine ecology progress series. Oldendorf**, 43(1): 181-188, 1988.
- FELDER, D. L. Diversity and ecological significance of deep-burrowing macrocrustaceans in coastal tropical waters of the Americas (Decapoda: Thalassinidea). **Interciencia** 26: 440-449, 2001.
- FERNANDES, L. D. A; BONECKER, S. L. C. Fases do desenvolvimento larval e metamorfose em Crustacea Decapoda – artigo de revisão. **Saúde e Ambiente em Revista**, 1 (2): 11-17, 2006.
- GEBAUER, P.; PASCHKE, K.; ANGER, Klaus. Seasonal variation in the nutritional vulnerability of first-stage larval porcelain crab, *Petrolisthes laevigatus* (Anomura: Porcellanidae) in southern Chile. **Journal of Experimental Marine Biology and Ecology**, v. 386, n. 1-2, p. 103-112, 2010.
- GIARRIZZO, T; KRUMME, U. Temporal patterns in the occurrence of selected tropical fishes in mangrove creeks: implications for the fisheries management in North Brazil. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, 52 (3): 679-688, 2009.
- KAISER, M. J.; ATTRILL, M. J., JENNINGS, S.; THOMAS, D. N., BARNNES, D. K. A.; BRIERLEY, A. S.; POLUNIN, N.V. C.; RAFFAELLI, D. G.; WILLIAMS, P. B. Marine Ecology Processes, Systems and Impacts. **Oxford University Press**, New York. 584p, 2006.
- MAGRIS, R. A.; FERNANDES, L. Loureiro. Levantamento preliminar das larvas de Porcellanidae (Decapoda, Anomura) do sistema estuarino dos rios Piraquê-açu e Piraquê-mirim, Aracruz, Espírito Santo. **Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology**, 9 (1): 49-54, 2005.
- MAGRIS, R. A.; LOUREIRO-FERNANDES, L. F. Diversity and distribution of assemblages of estuarine decapod larvae (Crustacea: Decapoda: Anomura, Brachyura) in tropical southeastern Brazil. **Zootaxa**, 2758 (1): 26-42, 2011.
- MCLUSKY, D. S.; ELLIOTT, M. The estuarine ecosystem: ecology, threats and management. **OUP Oxford**, 2004.

MUEHE, Dieter. Estado morfodinâmico praias no instante da observação: uma alternativa de identificação. **Revista brasileira de Oceanografia**, 46: 157-169, 1998.

OLSON, R. R.; OLSON, M. H. Food limitation of planktotrophic marine invertebrate larvae: does it control recruitment success? **Annual Review of Ecology and Systematics**. 225-247, 1989.

POHLE, G., SANTANA, W., MARTIN, J. W., OLESEN, J., & HØEG, J. T. Gebiidea and Axiidea (= Thalassinidea). **Atlas of Crustacean Larvae**, P. 263-271, 2014.

SCHWAMBORN, Ralf et al. Patrones dinámicos de transporte y migración de zooplancton en el estuario Catuama (Pernambuco, Brasil), con énfasis en las larvas de crustáceos decápodos. **Latin American journal of aquatic research**, 36 (1): 109-113, 2008.

VIEIRA, J.P.; CASTELLO, J.P.; PEREIRA, L.E. Ictiofauna. In: Seelinger, U.; Odebrecht, C.; Castello, J.P. (Org.). Os Ecossistemas Costeiro e Marinho do Extremo Sul do Brasil. **Ecoscience**. Rio Grande, p. 60-68, 1998.

WOOLDRIDGE, T. H.; LOUBSER, H. Larval release rhythms and tidal exchange in the estuarine mudprawn, *Upogebia africana*. **Hydrobiologia**, 337 (1): 113-121, 1996.

ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA:
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS

Qualis Capes: A2

Fator de Impacto: 1,811

Link de acesso às normas da revista:

<https://www.scielo.br/journal/aabc/about/#instructions>

Manuscrito

Contribuição das formas larvais dos camarões escavadores (Axiidea e Gebiidea) em um sistema marinho-estuarino tropical no Nordeste do Brasil

Marcos Antonio Lima Matoso^{1*}; Mônica Lúcia Botter-Carvalho²; Mauro de Melo Júnior².

¹ Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Departamento de Biologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 52171-900, Recife, Pernambuco, Brasil;

*matosomarcos@hotmail.com

² Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Biologia, 52171-900, Recife, Pernambuco, Brasil.

Resumo

Mesmo reconhecida a importância ecológica dos camarões-escavadores, há escassez de informações sobre suas larvais no ambiente natural. O presente trabalho teve o objetivo de descrever os padrões de distribuição, Abundância e biomassa larval do zooplâncton em sistema estuarino-marinho tropical com ênfase nos camarões-escavadores. O estudo ocorreu num sistema marinho-estuarino, entre as praias de Mangue Seco e Maria Farinha, no litoral norte de Pernambuco – Brasil. Foram realizadas coletas do zooplâncton e dos adultos dos camarões escavadores durante eventos de amostragem de seca e chuvosa. A amostragem ocorreu em três locais de coleta: Pluma estuarina, e águas costeiras da porção sul e da porção norte adjacentes à pluma. Os parâmetros

ambientais da água também foram mensurados. Foram realizados cálculos dos descritores ecológicos para os organismos coletados. Foi realizado um teste PERMANOVA para verificar diferenças na densidade larval entre os locais de coleta e os eventos de amostragem. Foram identificados 17 taxa de organismos zooplanctônicos, dos quais 5 foram dos camarões escavadores. Não foi possível identificar diferenças significativas entre os parâmetros estudados. Entretanto o padrão de distribuição das larvas apresentados a partir dos descritores ecológicos, mostrou que há predomínio das larvas dos camarões escavadores de origem estuarina (ex: *Axianassa australis*) no zooplâncton costeiro, decorrente do mecanismo de exportação larval, observado para ambas as espécies encontradas.

Palavras-chave: Thalassinidea, biomassa, distribuição, estuário, dispersão larval, corruptos, plâncton.

1 1. - INTRODUÇÃO

2 As zonas costeiras são consideradas regiões de ecótono, devido à transição entre
3 áreas continentais e oceânicas (Carvalho et al. 2017). Como partes integrantes dessa zona
4 estão às áreas estuarinas e o ambiente marinho (Muehe 1998). Essas regiões possuem
5 elevada importância ecológica, pois possuem vários ecossistemas, com condições
6 ambientais distintas, contribuindo assim, para o desenvolvimento e reprodução de
7 inúmeras espécies neles presentes (Castro et al. 2006).

8 É possível afirmar que os ambientes marinhos e estuarinos possuem grande
9 ligação, uma vez que, segundo a definição de Pritchard (1967), diz que estuários são
10 ambientes costeiros parcialmente fechados, onde ocorre a mistura de massas de água
11 doce, provenientes do continente, com massas de água salgada dos mares e oceanos. Ao
12 ir em direção ao mar, a porção final dos estuários, também chamada de desembocadura,
13 muitas vezes é margeada por praias arenosas, demonstrando assim, sua ligação (Miranda
14 et al. 2002).

15 As regiões estuarinas são consideradas uma das áreas mais produtivas do mundo
16 (French 1997). Por sua vez, as regiões marinhas possuem um amplo ambiente para a
17 distribuição e instalação de diversos organismos (Varolli 1986). Ambas compartilham
18 uma importância tanto ecológica quanto econômica, que é o fato de servirem de abrigo
19 para diversas espécies, como por exemplo, moluscos, crustáceos e peixes, que muitas
20 vezes de interesse comercial (Hamilton & Snedaker 1984, Friedrichs et al. 2009,
21 Kristensen et al. 2012).

22 Dentre os organismos que se destacam pela sua importância ecológica nesses
23 ambientes, estão os camarões escavadores que são crustáceos decápodes pertencentes às
24 infraordens Axiidea de Saint Laurent, 1979 e Gebiidea de Saint Laurent, 1979. Esses

25 animais estão presentes em praias arenosas e ambientes estuarinos de todo o mundo,
26 ocorrendo na maioria dos oceanos e mares, exceto em regiões polares (Dworschak 2005).
27 Sendo considerados como um dos mais comuns organismos de comunidades bentônicas
28 do mediolitoral, podendo também ser encontrado em regiões subtidais (<200m)
29 (Dworschak 2005).

30 Quando adultos, apresentam hábito de vida escavador e, portanto, são
31 considerados bioturbadores um dos motivos pelo qual esses organismos são tão
32 importantes nos ambientes em que vivem (Witbaard & Duineveld 1989, Webb & Eyre,
33 2004, Botter-Carvalho et al. 2007). E devido a sua atividade bioturbadora, são
34 considerados engenheiros ecossistêmicos, pois de maneira direta ou indireta, criam,
35 matem ou modificam ambientes para outras espécies (Berkenbusch & Rowden 2000,
36 Webb & Eyre 2004).

37 O grupo é conhecido popularmente como “camarões-fantasmas”, como por
38 exemplo, os representantes do gênero *Callichirus* Stimpson, 1866 e *Neocallichirus* Sakai,
39 1988 e “camarões-de-lama” como os representantes dos gêneros *Axianassissa* Schmitt,
40 1924 e *Upogebia* Leach, 1814, dentre outros (Dworschak et al. 2012). No Brasil, ambos
41 são chamados de “corruptos” (Rodrigues & Shimizu 1997, Sakai 2014). Ou
42 genericamente denominados de camarões escavadores.

43 Dentro do ciclo reprodutivo, esses animais possuem uma das suas fases iniciais de
44 vida no zooplâncton como larvas, o que os classificam como organismos
45 meroplantônicos (Morgado et al. 2006). No meroplâncton, as larvas dos crustáceos
46 decápodes podem se sobressair em diversidade, em relação aos demais grupos, uma vez
47 que, em períodos reprodutivos, chegam a contribuir com até 90% da biomassa
48 zooplantônica (Anger 2001). Entretanto, estudos sobre os estágios larvais das espécies

49 dos camarões escavadores são escassas, disponível apenas para aproximadamente 12,5%
50 das espécies conhecidas (Pohle et al. 2011).

51 Considerando as fases larvais de camarões escavadores, estudos em condições
52 laboratoriais mostram que elas podem passar aproximadamente 25 dias no zooplâncton,
53 em condições de temperatura mais baixas (Hill 1997), no entanto, pode existir grandes
54 variações nesse intervalo de tempo (Tamaki et al. 1996). Durante o desenvolvimento das
55 larvas, dependendo das espécies, esses organismos podem passar por um número de
56 estágios variados, iniciando com a pré-zoea, que é um estágio bastante curto,
57 correspondente à fase ainda não alimentar desses organismos (Strasser & Felder 2000), e
58 os estágios posteriores são os de zoea, megalopa e juvenil, com todas as fases de vida
59 livre (Paula et al. 2001).

60 Dentro do ambiente aquático, alguns efeitos decorrentes de mudanças sazonais,
61 como, por exemplo, temperatura, salinidade, pH e disponibilidade de alimento, em geral,
62 atuam como variáveis que influenciam na dispersão larval (Gebauer et al. 2010, Magris
63 et al. 2011). Um outro caso que pode contribuir para o modo de dispersão das larvas é o
64 fato de que, é comum para a grande maioria dos decápodes adotarem estratégias de
65 dispersão das larvas para regiões de condições favoráveis para o sucesso do seu
66 desenvolvimento, ou realizam a retenção das larvas, em que ficam próximas ao ambiente
67 em que eclodiram (Wooldridge & Loubuser 1996).

68 Embora existam vários estudos abordando a importância ecológica e econômica
69 desses animais, restam algumas lacunas a serem preenchidas (Hernández et al. 2008).
70 Estudar o padrão de distribuição das espécies pode fornecer relevantes informações sobre
71 a história de vida dos organismos, tais como períodos reprodutivos, eventos de desova,
72 alcance dispersivo, além de estado de conservação e localização das populações adultas
73 (Hernández et al. 2018).

74 O presente estudo tem o objetivo verificar a estrutura das larvas planctônicas de
75 camarões escavadores em um ambiente costeiro com influência estuarina e relacionar
76 com a ocorrência de ocorrência de fêmeas ovígeras do bentos local. Além de descrever a
77 contribuição dos estágios larvais dos camarões escavadores para o zooplâncton em termos
78 de composição, densidade, abundância, frequência de ocorrência e biomassa.

79 **2 – MATERIAL E MÉTODOS**

80 *2.1 Caracterização da área de Estudo*

81 A região litorânea do estado de Pernambuco é caracterizada por apresentar um
82 clima tropical ou Pseudotropical quente e úmido do tipo As', segundo a classificação de
83 Köppen (1948), (Nimer 1979, Greco 2004). O local de estudo está inserido entre as praias
84 de Mangue Seco e Maria Farinha, nos municípios de Igarassu e Paulista, respectivamente,
85 no litoral norte Pernambucano, com distância média de 30 km do centro do Recife.
86 Segundo Lira et al. (2010) existe um sistema sazonal de ventos sobre a direção das
87 correntes na costa de Pernambuco, predominantemente no sentido Sul-Norte.

88 As etapas de campo foram realizadas em uma área de ambiente marinho, levando
89 em consideração a ocorrência de uma pluma estuarina, e tomando-a como referência, o
90 local foi dividido em três regiões distintas. A área central da pluma estuarina (PE)
91 ocasionada devido a desembocadura do Rio Timbó e suas extremidades, onde na porção
92 norte (PN) está a região que sofre maior influência estuarina, na praia de Mangue Seco,
93 já na porção sul (PS) é a região menos influenciada pelo estuário (Figura 1).

94 *2.2 Estratégia amostral e Procedimentos de campo*

95 *2.2.1 Zooplâncton*

96 A estratégia amostral para o plâncton consistiu em seis campanhas, sendo
97 três durante eventos de seca (fevereiro, abril e setembro de 2021) e três em eventos
98 chuvosos (maio, junho e julho de 2021), para a coleta do zooplâncton e,
99 consequentemente, das larvas dos camarões escavadores.

100 2.2.2 Coleta do zooplâncton

101 As amostras de zooplâncton foram obtidas através de coletas realizadas durante a
102 maré vazante (0,0 a 0,3 m), no período da manhã, nos três locais pré-definidos: Pluma
103 Estuarina da desembocadura do rio Timbó (PE), Porção Norte (PN) e Porção Sul (PS)
104 (Figura 1). As larvas e demais grupos zooplanctônicos foram coletadas através de arrastos
105 horizontais superficiais, sempre no sentido contrário à correnteza, utilizando uma rede de
106 arrasto de plâncton com abertura de malha de 300 µm. Os arrastos foram feitos com
107 embarcação motorizada, com tempo de duração aproximadamente de 5 minutos e
108 velocidade de aproximadamente, dois nós. Após cada coleta, as amostras foram fixadas
109 com formaldeído diluído a 4% em água do mar e armazenadas em potes plásticos de 500
110 mL.

111 2.2.3 Bentos

112 Para a coleta dos organismos bentônicos, foram realizadas quatro
113 campanhas, duas durante eventos de amostragem secos (março e setembro de
114 2021) e duas em chuvosos (junho e julho de 2021), para a coleta dos indivíduos
115 adultos, onde em cada campanha, foram coletados 20 indivíduos, afim de verificar
116 a ocorrência fêmeas ovígeras (FO) e identificar as espécies de camarões
117 escavadores na área.

118 2.2.4 Coleta dos indivíduos adultos

119 As coletas dos indivíduos adultos de espécies dos camarões escavadores ocorreram
120 na praia de Mangue seco, Igarassu – PE, durante a maré baixa (0,0 a 0,3 m), seguindo a
121 tábuca de maré da DHN, para o Porto do Recife, sempre durante o período diurno.

122 Os animais foram coletados de maneira sistemática, a partir da identificação de
123 abertura de galerias, num percurso de 400 m, onde o ponto inicial estava mais próximo
124 ao estuário do Rio Timbó, finalizando na região mais ao centro da praia de Mangue seco,
125 durante toda região do mediolitoral, afim de obter fêmeas ovígeras e identificar quais
126 espécies estavam em período reprodutivo. As coletas foram realizadas com bombas de
127 sucção manual e os indivíduos encontrados foram retidos em peneiras, posteriormente,
128 foram acondicionados em potes plásticos individuais com formol salino a 4%.

129 2.3 Mensuração e coleta dos parâmetros ambientais

130 Para as coletas do zooplâncton, foram registradas as variáveis hidrológicas
131 temperatura, pH e salinidade, com termômetro, fita indicadora de pH e refratômetro,
132 respectivamente.

133 2.4 Procedimentos de laboratório

134 2.4.1 Da análise e triagem do zooplâncton

135 Em laboratório, os organismos zooplanctônicos foram analisadas a partir das
136 amostras totais. Previamente, as amostras foram coradas utilizando o corante Rosa de
137 Bengala, para auxiliar na triagem, contagem e identificação dos *taxa*. As amostras foram
138 colocadas em placa de acrílico, e foi utilizado estereomicroscópio binocular (lupa) para a
139 identificação, inicialmente, a nível de grandes grupos, de acordo com literatura

140 especializada, e um contador numérico manual para a contagem dos organismos. Um
141 microscópio óptico foi utilizado para identificação das espécies e estágio de
142 desenvolvimento larval dos camarões escavadores, baseando-se na literatura
143 especializada: Rodrigues (1976), Ngoc-Ho (1981), Strasser & Felder (1999), Anger
144 (2001), Abrunhosa et al. (2005), Phole et al. (2014) e Oliveira et al. (2012a).

145 Posteriormente os dados obtidos foram utilizados para o registro da composição
146 taxonômica e densidade, que também serviu para calcular a abundância relativa (RA),
147 frequência de ocorrência (FrO) e biomassa dos *taxa* encontrados. Para a obtenção dos
148 valores da biomassa do zooplâncton, foi realizado o procedimento de peso úmido (PU),
149 em balança analítica de precisão (0,0001 g). Com os organismos retidos em concentrador
150 de plâncton, foram utilizadas toalhas de papel absorvente para retirar o excesso de
151 umidade, após verificada a ausência de umidade nos papéis, o material foi pesado. O peso
152 úmido obtido foi convertido em miligramas (mg).

153 *2.4.2 Dos camarões escavadores adultos*

154 As fêmeas ovígeras foram identificadas e sua ocorrência foi registrada. Todos os
155 camarões escavadores adultos foram identificados no menor nível taxonômico possível,
156 segundo literatura especializada, o sexo foi identificado a partir da ausência e/ou da
157 diferença morfológica no primeiro par de pleópodes e contabilizados.

158 *2.5 Tratamento numérico dos dados*

159 *2.5.1 Zooplâncton*

160 I. **Densidade** – A densidade dos organismos por volume foi obtida pelo seguinte
161 cálculo:

162 $D = Ni/Vf*100$, onde Ni = Número total dos indivíduos de cada táxon na amostra;
163 Vf = Volume total de água filtrado (obtido a partir de um fluxômetro).

164 Todos os valores foram expressos em ind./100m³.

165 **II. Abundância relativa** – A abundância relativa foi calculada pela fórmula:

166 $AR = Dt*100/D$, onde Dt = densidade total de organismos de cada táxon nas
167 amostras; D = densidade total dos organismos nas amostras. O valor foi expresso em
168 percentagem (AR%), e para ajudar na interpretação dos resultados, levou em
169 consideração a seguinte classificação: Muito abundante (>70%), abundante (70 – 40%),
170 pouco abundante (40 – 20%) e raro (≤20%) (modificado de Dajoz 1983).

171 **III. Frequência de ocorrência** – A frequência de ocorrência foi obtida com a
172 fórmula:

173 $FrO = Nt*100/Ta$, onde Nt = Número de amostras em que de cada táxon ocorre; Ta
174 = Número total de amostras. E com os resultados em forma de percentagem (FrO%),
175 foram atribuídos os seguintes critérios: Muito frequente (>70%), frequente (70 – 40%),
176 pouco frequente (40 – 20%) e raro (≤20%).

177 **IV. Biomassa** – Para a estimativa da biomassa, foi realizada através da seguinte
178 fórmula:

179 $B = PU*D$; onde, PU = Peso úmido dos organismos de cada táxon; D = densidade
180 de cada táxon na mostra. O resultado foi expresso em mg/100m³.

181 2.5.2 *Bentos*

182 Para fêmeas ovígeras coletadas, foram feitos os seguintes cálculos:

183 I. **Abundância relativa** – Foi levado em consideração o número total de fêmeas
184 ovígeras de cada táxon (n), em relação ao número total de organismos na amostra (N).

185 $Ar = n * 100 / N$, o valor foi expresso em percentagem (Ar%),

186 II. **Frequência de ocorrência** – foi feita a relação entre número de amostras em que
187 cada táxon ocorreu (t) pelo número total de amostras T.

188 $FrO = t * 100 / T$, o valor foi expresso em percentagem (FrO%), obedecendo a
189 seguinte classificação: Muito frequente (>70%), frequente (70 – 40%), pouco frequente
190 (40 – 20%) e raro ($\leq 20\%$) (modificado de Dajoz 1983).

191 2.6 *Análise dos dados*

192 2.6.1 *Zooplâncton*

193 Para as análises multivariadas, os dados de densidade larval foram previamente
194 transformados com $\log(x+1)$, e convertidos em uma matriz de similaridade de Bray-
195 Curtis. Uma análise de variância multivariada com permutações (PERMANOVA a dois
196 fatores) foi realizada para testar os efeitos dos fatores Locais (Fixo com 3 níveis: pluma
197 estuarina - PE, porção norte - PN e porção sul - PS) e sazonalidade (Fixo com 2 níveis:
198 seco e chuvoso) em relação a densidade larval dos camarões escavadores. A
199 PERMANOVA foi realizada com 9999 permutações e se o número de permutação foi
200 inferior a 100, a permutação de Monte Carlo foi usada para testar as possíveis diferenças
201 entre as assembleias associadas aos fatores. A homogeneidade das dispersões entre os

202 grupos de amostra foi testada usando uma rotina PERMDISP (Anderson 2006). Os
203 resultados da PERMANOVA foram então representados usando uma análise de
204 escalonamento multidimensional não métrico (nMDS).

205 A análise de similaridade (SIMPER) foi aplicada para verificar quais grupos mais
206 contribuíram para dissimilaridades entre amostras para os fatores analisados (locais e
207 sazonalidade) com ponto de corte de 80%. A análise de componentes principais (PCA)
208 com distância euclidiana foi realizada para verificar a possível relação entre os dados
209 ambientais (temperatura, pH e salinidade) e a densidade larval, entre locais de coleta e
210 sazonalidade. O nível de significância adotado para as análises foi $\alpha = 0,05$. As análises
211 foram realizadas usando o programa PRIMER (versão 6.0) com o pacote de atualização
212 PERMANOVA (Anderson et al. 2008; Clarke & Gorley 2006).

213 **3 - RESULTADOS**

214 *3.1 Parâmetros ambientais:*

215 Os parâmetros ambientais hidrológicos apresentaram poucas variações durante
216 todo o período de estudo em relação às locais de coleta e aos eventos de amostragem,
217 como pode ser observado na Tabela I.

218 A temperatura da água para todas os locais de coleta, durante o período de estudo
219 variou de 24°C a 29,6°C; com temperatura média de 27,3°C ($\pm 1,2$) para as águas que
220 correspondem a porção sul; 28,3°C ($\pm 1,1$) para a porção norte e 27,1°C ($\pm 2,2$) para a
221 pluma estuarina. Para o pH, o valor mínimo foi de 6,0 e máximo de 7,72; onde o maior
222 valor registrado foi na porção sul, durante o mês de fevereiro, e o menor valor ocorreu na
223 porção norte, no mês de junho e nas porções norte e sul do mês de julho; com pH médio
224 de 6,9 ($\pm 0,6$) para a porção sul, 6,7 ($\pm 0,7$) para a porção norte e 7,4 ($\pm 0,3$) para a pluma

225 estuarina. A salinidade obteve seu maior registro durante o evento amostral de seca em
226 setembro de 2021, com 34, já o menor valor encontrado foi de 30, ocorrendo em todos os
227 meses do estudo, exceto no mês de setembro. Enquanto as médias mensais da salinidade
228 por estação de coleta foram de 31,7 ($\pm 1,6$); 31,9 ($\pm 0,8$) e 30,8 ($\pm 1,3$) obtidos para a porção
229 sul, porção norte e pluma estuarina, respectivamente (Figura 2).

230 Com base nos resultados obtidos pela Análise dos Componentes Principais para
231 os parâmetros ambientais pH, temperatura e salinidade (Figura 3), mostrou que os dois
232 primeiros componentes acumulados foram responsáveis por 82,1% da variação total dos
233 parâmetros ambientais entre os locais de coleta e os eventos de amostragem seco e
234 chuvoso, em que o PC1 foi responsável por 45,9%, em que a temperatura e o pH foram
235 os principais responsáveis e o PC 2, por 36,2% com pH e salinidade com a maior parte
236 da contribuição das variações dos dados (Tabela II).

237 *3.2 Zooplâncton e estágios larvais dos camarões escavadores*

238 *3.2.1 Composição e densidade*

239 Dos organismos zooplancctônicos coletados foram identificados 17 *taxa* (Tabela
240 III), com o registro do subfilo Crustacea, representados pelos Copepoda Milne Edwards,
241 1840, Cirripedia Burmeister, 1834, Brachyura Latreille, 1802, Porcellanidae Haworth,
242 1825, Alpheidae Rafinesque 1815, Axiidea de Saint Laurent ,1979, Gebiidea de Saint
243 Laurent, 1979, Luciferidae De Hann, 1849, Penaeidae Rafinesque, 1815 e Amphipoda
244 Latreille, 1816; o filo Chaetognata e pelo filo Chordata com representantes dos
245 Appendicularia Fol, 1874 e dos Teleostei.

246 Quanto aos organismos planctônicos coletados, separados para a identificação dos
247 estágios larvais dos camarões escavadores (Figura 4), foi possível o registro de espécimes

248 pertencentes as duas infraordens: Axiidea, com a família Callichiridae e as espécies:
249 *Callichirus corruptus*, *Lepidophthalmus siriboia* e *Neocallichirus* sp. Já a infraordem
250 Gebiidea contou com as famílias Axianassidae e Upogebiidae, com as espécies *Axianassa*
251 *australis* e *Upogebia* sp., respectivamente. Todas as larvas coletadas estavam no estágio
252 de desenvolvimento inicial, ou seja, zoea 1 (Z1), e apenas uma larva de *C. corruptus* no
253 estágio de zoea 2 (Z2).

254 A densidade máxima foi de 105.361,3 ind./100m³, registrada para os Copepoda,
255 na porção sul, em julho de 2021 (c), já a densidade mínima estimada para o zooplâncton
256 total foi de 5,8 ind./100m³ para vários taxa durante todo o período de estudo. A média da
257 densidade por grupo taxonômico variou de 0,3 ind./100m³ ($\pm 1,3$) a 10.755,6 ind./100m³
258 ($\pm 25895,7$), com densidade média para todo o zooplâncton de 914,1 ind./100m³ ($\pm 2634,2$)
259 (Figura 6 – a).

260 Ao verificar a densidade para os estágios larvais dos camarões escavadores,
261 observou-se que as larvas de *Axianassa australis* (Z1) apresentaram densidade máxima
262 de 1.276,2 ind./100m³, em maio de 2021 (c), na porção Sul. Já o valor mínimo foi de 5,8
263 ind./100m³, na porção Norte, em maio de 2021 (c). As larvas de *A. australis* também
264 apresentou o maior valor dentre todos os organismos desse grupo; com média de 111,4
265 ind./100m³. Enquanto que as larvas de *Callichirus corruptus* (Z2) e *Lepidophthalmus*
266 *siriboia* (Z1) apresentaram os menores valores de densidade, com densidade total de 5,8
267 ind./100m³ registrado apenas na porção sul, em setembro de 2021 (s), para ambas espécies
268 e média de <1 ind./100m³ ($\pm 1,3$) e a máxima foi de 5,8 ind./100m³, (Figura 6 - b).

269 Embora a densidade larval de *A. australis* seja constantemente maior que as
270 demais larvas do grupo, em especial durante um evento chuvoso (junho de 2021) na
271 porção sul da área do estudo, não encontramos diferença na densidade larval entre os
272 locais de coleta e eventos de amostragem ($p > 0,005$) (Tabela IV).

273 A configuração gráfica do nMDS não mostrou uma clara separação da relação da
274 densidade entre os locais de coleta durante os eventos de amostragem seco e chuvoso
275 (Figura 5). Contudo, é possível observar um discreto agrupamento na porção sul, onde as
276 águas costeiras dessa região sofrem menor influência estuarina, a densidade larval para
277 este local demonstra ser mais equilibrada.

278 Através da análise da porcentagem de similaridade (SIMPER), verificou-se que A
279 espécie *Axianassa australis* (Z1) (37,38%), foi o grupo que mais contribuiu para a
280 dissimilaridade do agrupamento entre a densidade larval da PN e PS (dissimilaridade
281 média = 57,01%). A fase larval dessa mesma espécie também foi a principal contribuinte
282 para a relação de dissimilaridade entre PS e PE (dissimilaridade média = 60,25%), e PN
283 e PE (dissimilaridade média = 63,04%,) com 35,29% e 40,16%, respectivamente (Tabela
284 V). O mesmo padrão pode ser observado quando comparado os eventos de amostragem
285 seco e chuvoso (dissimilaridade média = 55,43%), as larvas de *A. australis* contribuíram
286 com (38,18%), seguida por *Upogebia* sp. (26,46%) foram as que mais contribuíram para
287 a dissimilaridade entres esses eventos (Tabela 6).

288 3.2.2 – Abundância relativa, frequência de ocorrência e biomassa

289 De acordo com o cálculo da abundância relativa total para o zooplâncton, os
290 grupos que tiveram maior representatividade, foram os Copepoda com 69,214%, sendo
291 este o único classificado como abundante; e os Brachyura que contribuíram com
292 19,109%. As zoea de Brachyura, mesmo sendo o segundo grupo que mais contribuiu,
293 foram classificados como raros, assim como todos os demais grupos (Tabela III).
294 Enquanto que os organismos que foram menos representativos foram os Axiidea, com as
295 larvas de *C. corruptus* (Z2) e *L. siriboia* (Z1), ambas com 0,002%.

296 A comparação da abundância relativa zooplanctônica entre os locais de coletas:
297 Porção Sul (PS), Porção Norte (PN) e Pluma Estuarina (PE), e pelos eventos de
298 amostragem: seco (s) e chuvoso (c), mostrou que os Copepoda continuaram como os mais
299 representativos em quase todos os casos, chegando a ser dominante na PS com 79,642%,
300 e para a PE representou 30,955%; no evento amostral seco contribuiu com 45,308% e no
301 chuvoso 78,870%, sendo o dominante para este último caso. A abundância relativa para
302 a PN foi exceção, onde os organismos que mais contribuíram foram as zoea de *Brachyura*
303 com 59,063%, classificados como abundantes. De maneira semelhante entre as
304 comparações, os organismos menos abundantes na PS foram as zoea de *C. corruptus* (Z2)
305 e de *L. siriboia* (Z1), ambas com 0,003%; para a PN foram as zoea de *C. corruptus* (Z1)
306 com 0,035%, na PE as zoea (Z1) de *Neocallichirus* sp. e de *Upogebia* sp. com 0,033%
307 para ambas. Os organismos que menos participaram por eventos de amostragem foram
308 as zoea de *C. corruptus* (Z2), *L. siriboia* (Z1) e *Neocallichirus* sp. (Z1), com 0,007% para
309 o evento seco e *Neocallichirus* sp. (Z1) para o chuvoso, com 0,009%. (Tabela III).

310 A abundância relativa apenas entre o grupo das larvas dos camarões escavadores
311 caracterizou-se pelo predomínio da infraordem Gebiidea, onde a espécie *A. australis*
312 apresentou-se como a dominante para o grupo em todas os locais de coleta com 86,3%
313 para a porção sul, 85,185% para a porção norte, 82,609% para a pluma estuarina, onde,
314 sendo dessa forma, como muito abundantes. Durante os eventos representativos de seca,
315 o grupo de larvas desta mesma espécie teve sua abundância de 69,474%; já no período
316 chuvoso, representou 91,148% das larvas. Todas as demais espécies foram classificadas
317 como raras (Figura 7).

318 Quanto a frequência de ocorrência, foi caracterizada pelo predomínio dos
319 Copepoda e pelos *Brachyura*, que dentre os organismos classificados como muito
320 frequentes, estes obtiveram os maiores valores, ambos com FrO = 100%. Os estágios

321 larvais dos axiídeos *Lepidophthalmus siriboia* e *Callichirus corruptus* (Z2) foram os
322 menos encontrados, com frequência de ocorrência de 5,6% (Figura 8).

323 Ao observar a frequência de ocorrência para as larvas dos camarões escavadores
324 entre os locais de coleta, foi possível notar um padrão, onde os representantes do Gebiidea
325 predominaram e foram distribuídos da seguinte forma, na porção sul do estudo: as zoea
326 de *Axianassa australis* e de *Upogebia* sp. foram classificadas como frequentes, com
327 valores de 67% e 50%, respectivamente; as zoea de *Callichirus corruptus* (Z1 e Z2),
328 *Lepidophthalmus siriboia* e *Neocallichirus* sp. tiveram presentes apenas em 17% das
329 amostras, sendo então classificadas como raras. Para a porção norte, foram frequentes
330 *Axianassa australis* e *Upogebia* sp., estando presentes novamente em 67% e 50% das
331 amostras. *Callichirus corruptus* (Z1) foi único representante da família dos Callichiridae,
332 que esteve presente na porção norte, com frequência de ocorrência de 17%. As larvas de
333 *C. corruptus* (Z2). Já na pluma estuarina, todas as larvas dos camarões escavadores foram
334 classificadas como raras, com os seguintes valores de frequência de ocorrência:
335 *Axianassa australis* (33%), *Neocallichirus* sp. (33%), *Upogebia* sp. (17%).

336 Em relação aos eventos de amostragem representativos de seca, foi possível
337 registrar todas as larvas, mesmo que em frequências diferentes. *Axianassa australis*
338 esteve presente em 100% das amostras durante os eventos de amostragem seco, sendo
339 considerada como muito frequente. *Upogebia* sp. e *Callichirus corruptus* (Z1), estiveram
340 presentes em 67% das amostras. Classificadas como pouco frequentes estavam as zoea
341 de *Callichirus corruptus* (Z2), *Lepidophthalmus siriboia* e *Neocallichirus* sp. sendo
342 coletadas em 33% das amostras. No entanto, nos eventos de amostragem chuvosos, as
343 zoea de *Axianassa australis* e *Upogebia* sp. foram muito frequentes estando em 100%
344 das amostras. *Neocallichirus* sp. foi frequente, apresentando-se em 67% das amostras. As
345 demais larvas dos camarões escavadores não estiveram presente durante os eventos

346 chuvosos, sendo então, consideradas raras. Os valores de frequência de ocorrência
347 exclusivamente das larvas dos camarões escavadores, tanto para os locais de coleta,
348 quanto para os eventos de amostragem estão representados na Figura 9.

349 O valor de biomassa do zooplâncton em peso úmido (PU) variou de 0,0001
350 mg/100m³ a 5,9193 mg/100m³, para os Appendicularia e Copepoda respectivamente. A
351 Figura 10 mostra o quanto que cada organismo contribuiu para a biomassa total do
352 zooplâncton. O valor mínimo da soma das biomassas para todos os organismos foi de
353 0,0008 mg/100m³ para *L. siriboia* e *C. corruptus* (Z2), enquanto que os organismos que
354 mais contribuíram em biomassa foram os Teleostei, com 11,1327 mg/100m³.

355 O valor total da soma da biomassa larval para os camarões escavadores foi de
356 1,8236 mg/100m³, distribuídos de maneira que os menores valores obtidos para cada
357 estação de coleta foi de: 0,0008 mg/100m³ para a porção sul com de *C. corruptus* (Z2) e
358 *L. siriboia* (Z1), na porção norte com 0,0008 mg/100m³ com *C. corruptus* (Z1), para
359 pluma estuarina foi de 0,0012 com *Upogebia* sp. (Z1). Os menores valores por eventos
360 amostrais foram de 0,0008 mg/100m³ com *C. corruptus* (Z2) e *L. siriboia* (Z1) para o
361 seco e 0,0031 mg/100m³ dos *Neocallichirus* sp. (Z1) para o evento chuvoso. Em
362 contrapartida, todos os maiores valores de biomassa obtidos foram através da
363 contribuição das larvas de *A. australis* (Z1), que para a Porção Sul teve seu valor de
364 1,5390 mg/100m³, para a Porção Norte foi de 0,1195 mg/100m³ e para a PN de 0,0987
365 mg/100m³. Os eventos de amostragem seco contaram com 1,7717 mg/100m³ e o chuvoso
366 com 1,6210 mg/100m³ de valores máximos para as larvas de *A. australis* (Figura 11).

367 3.3 – Camarões Escavadores

368 Foram coletados 80 indivíduos adultos de camarões escavadores, sendo 40
369 indivíduos em cada período sazonal (20 indivíduos adultos por mês). Os animais estavam

370 distribuídos em 2 infraordens, 3 famílias e 6 gêneros. Na Infraordem Axiidea, foram
371 registradas as famílias Callianassidae Dana, 1852 com a espécie *Fragilianassa fragilis*
372 Biffar, 1970 e Callichiridae Manning & Felder, 1991 com quatro espécies: *Callichirus*
373 *corruptus* Say, 1818, *Lepidophthalmus siriboia* Felder & Almeida Rodrigues 1993,
374 *Neocallichirus maryae* Karasawa 2004 e *N. grandimana* Gibbes, 1850. Além de outros
375 representantes identificados como *Neocallichirus* sp. Na infraordem Gebiidea, apenas
376 espécimes da família Upogebiidae Borradaile, 1903, identificados como *Upogebia* sp.

377 Dentre os organismos coletados, a espécie *N. maryae* foi a mais representativa
378 com aproximadamente 27,2% do total das amostras. Enquanto que *C. corruptus* e *F.*
379 *fragilis* contribuíram apenas com 1,2% dos taxa encontrados. Alguns indivíduos
380 coletados foram danificados durante o bombeamento, impossibilitando sua identificação,
381 portanto, classificados como outros (Tabela VII).

382 Quanto à identificação do sexo dos camarões escavadores, do total dos indivíduos
383 coletados, foram registrados 22 machos (M), 7 indivíduos com o sexo não identificado
384 ou por estarem danificados, ou por serem juvenis, e 51 fêmeas (F), das quais 9 eram
385 ovígeras (FO). As fêmeas ovígeras pertenceram as seguintes espécies: *C. corruptus*, *L.*
386 *siriboia*, *N. grandimana*, *N. maryae* e *Upogebia* sp. e ocorreram durante, praticamente,
387 todos os meses, exceto em julho de 2021 (Tabela VIII).

388 4 – DISCUSSÃO

389 4.1 – Parâmetros ambientais

390 Dentre as variáveis ambientais estudadas (temperatura, pH e salinidade), apesar
391 de não ter sido encontrada diferenças significativas, o pH foi a que apresentou maior
392 dissimilaridade entre os demais fatores abióticos estudados. Naturalmente, a água do mar

393 é considerada ligeiramente alcalina, com variação média do pH de 7,5 a 8,4 (Sodré et al.,
394 2016). No presente estudo, a média geral estimada para o pH foi de 7, o que significa, em
395 termos gerais, que está dentro das condições do nível de acidez já reconhecido para águas
396 marinhas.

397 A temperatura média da água e o valor médio da salinidade seguiram um padrão
398 sazonal de maiores temperatura para o litoral nordestino brasileiro no período seco
399 (Aragão 1998; Alves-Júnior et al. 2014). Com valores mais elevados durante os eventos
400 de amostragem de seca, com uma leve redução durante os eventos de chuva. O que pode
401 ser explicado pelas constantes precipitações do período chuvoso, o que acarreta no maior
402 aporte de água doce nesses ambientes, diminuindo os valores de temperatura e salinidade.

403 4.2 – Fases larvais dos camarões escavadores e fêmeas ovígeras

404 Em decápodes, o período reprodutivo costuma ser determinado levando em
405 consideração os meses em que são encontradas fêmeas ovígeras durante um ciclo anual
406 (Cobo 2002), podendo ser classificado em contínuo ou sazonal (Sastrey 1983).

407 Para a maioria dos crustáceos, principalmente em regiões tropicais e subtropicais,
408 o período reprodutivo costuma ser contínuo, com picos de reprodução coincidindo com
409 temperaturas mais elevadas (Koettker & Freire 2006). Devido ao pouco registro de
410 fêmeas ovígeras coletadas (n=9), não foi possível afirmar que há de fato, coincidência
411 entre as espécies que apareceram em período reprodutivo, com as larvas presentes no
412 plâncton. Porém, é possível perceber uma semelhança no padrão em que as fêmeas
413 aparecem ovígeras e a ocorrência de suas larvas.

414 A baixa abundância das fêmeas ovígeras pode ser explicado por, além das poucas
415 campanhas de coletas, pelo fato de que no período de incubação, as fêmeas ovígeras
416 permaneçam na região mais profunda de suas galerias dificultando sua captura pelas

417 bombas de sucção (Coelho et al. 2000; Peiró et al. 2014). Uma outra possibilidade para
418 isso, é que como um comportamento reprodutivo, os machos fecundem apenas uma ou
419 poucas fêmeas como afirmam Hernáez & Wehrtmann (2007).

420 O padrão de reprodução sazonal pode ser observado no estudo com a espécie
421 *Callianassa japonica* Ortmann, 1891 (Temaki, 1996). Enquanto que o período
422 reprodutivo contínuo foi observado em *Callichirus corruptus* (Rodrigues & Shimizu
423 1997; Botter-Carvalho et al. 2007, Peiró et al. 2014), *Lepidophthalmus siriboia* (Oliveira
424 et al. 2012b; Rosa Filho et al. 2013) e *Upogebia vasquezi* (Oliveira et al. 2012b).

425 Um fato intrigante em relação às larvas e as fêmeas ovígeras capturadas é - como
426 larvas da espécie *Axianassa australis* foram coletadas de maneira expressiva no
427 zooplâncton e sua fase adulta não foi encontrada? Este fato pode ser explicado pelo
428 conjunto dos fatores a seguir: esta espécie, quando adulta, habita ambientes de
429 manguezais, estuarinos e planícies lamosas (Dworschak & Rodrigues 1997, Felder 2001),
430 no Estado de Pernambuco há o registro de *A. australis* em uma planície lamosa, localizada
431 numa região costeira ao sul (Botter-Carvalho et al. 2015) em relação a área em estudo
432 atual e numa área estuarina localizada mais ao norte (Coelho 1997). A reprodução de
433 organismos estuarinos envolve comportamentos complexos como é o caso da retenção e
434 exportação das larvas (Wooldridge & Loubser 1996). Sugere-se então que, ao liberarem
435 suas larvas no ambiente de origem, por sua vez, estas são exportadas para áreas costeiras
436 com condições necessárias para o completar seu desenvolvimento. Durante esse processo,
437 a dinâmica das correntes marinhas, transportam essas larvas para ambientes onde os
438 indivíduos adultos não ocorrem. Como observado por Oliveira et al. (2012b) para
439 *Callichirus corruptus* e Rodrigues-Inoue et al (2021) para larvas de *Axianassa* sp. e de
440 *Galanthe* sp. A ausência dos adultos na área do presente estudo, pode ser resultado dos
441 filtros ambientais, uma vez que os adultos de *A. australis* tem preferência por sedimento

442 lamoso e com pouca quantidade de oxigênio (Felder 2001) e a praia de Mangue Seco,
443 local onde foi feita a coleta dos indivíduos adultos, não oferece essas condições para o
444 assentamento larval e estabelecimento da espécie.

445 Além disso, para todos os *taxa* dos camarões escavadores identificados, houve o
446 grande predomínio das zoea apenas no primeiro estágio de desenvolvimento. Reforçando
447 a ideia de que as larvas adotam a estratégia de exportação para ambientes mais distantes
448 para completar seu desenvolvimento. Durante um estudo com as fases larvais de
449 *Petrolisthes armatus* (Gibbes, 1850), numa região estuarina da Costa Rica, Díaz-
450 Ferguson & Vargas-Zamora (2001) coletaram apenas zoea no primeiro estágio de
451 desenvolvimento, assim como Oliveira et al. (2012b) para as larvas de *Lepidophthalmus*
452 *siriboia*. Um outro fator que deve ser levado em consideração é o tempo de muda entre
453 os estágios de zoea, que podem ser mais longos, como é o caso de *Axianassa australis*
454 que levam cerca de 3 a 4 dias para realizarem sua primeira muda (Strasser & Felder 2007),
455 permanecendo mais tempo no zooplâncton; ou mais curtos como *L. siriboia* que passam
456 apenas de 3 a 19 horas para mudar de estágio de zoea (Abrunhosa et al., 2005) realizando
457 um rápido assentamento.

458 4.3 – Zooplâncton e descritores ecológicos

459 Levando em consideração os dados de densidade total do zooplâncton, notou-se
460 que uma discreta variação na quantidade dos organismos coletados entre os eventos de
461 chuvas, com 22137,4 ind./100m³, e seca que totalizou 8942 ind./100m³. No geral, para
462 esse tipo de estudo em regiões tropicais é comum que o período seco registre as maiores
463 densidades dos organismos planctônicos (Nascimento-Vieira & Sant'Anna 1989;
464 Sant'Anna 1993). Contudo, assim como no presente estudo, um padrão de maior
465 densidade do zooplâncton em sistemas marinho-estuarino, durante o período chuvoso, foi

466 relatado por, Araújo (1996) e Rocha et al. (2009). Neumann-Leitão (1994) explica que
467 um mesmo sistema pode apresentar variações na densidade dos organismos por um
468 determinado período de tempo, dependendo dos fatores predominantes, como por
469 exemplo: recrutamento larval, fontes de alimento e fatores físico-químicos do ambiente
470 que resultem em processos de importação e exportação larval.

471 A principal característica para o zooplâncton no estudo foi o fato de ser abundante
472 e pouco diversificado, havendo quase sempre o predomínio dos Copepoda, seguidos pelas
473 zoea de Brachyura, nauplius de Cirripedia e os Appendicularia, como os mais abundantes
474 dentre todos os organismos coletados; este mesmo padrão dos *taxa* mais abundantes foi
475 encontrado por Schwamborn et al. (2001) e Melo Júnior et al. (2016) no complexo
476 estuarino de Itamaracá, local adjacente à área do atual estudo. Como pode ser observado
477 nos estudos citados, é comum que em zonas marinho-estuarinas, principalmente na região
478 nordeste do Brasil, o zooplâncton seja dominado pelos Copepoda, ocorrendo picos de na
479 presença de larvas meroplancônicas em diversos momentos do ano, fato este que pode
480 estar associado aos períodos reprodutivos dos adultos bentônicos.

481 A biomassa úmida geral, foi exceção, em que as larvas de Teleostei foram as que
482 mais contribuíram mesmo estando em menor quantidade. Porém devido ao seu tamanho
483 corporal relativamente maior, resultou no mais alto valor para a biomassa úmida. Seguido
484 pelos Copepoda, que por sua vez, a alta densidade desses organismos influenciou
485 diretamente no valor da biomassa, e as zoea de Brachyura foram os que mais se
486 destacaram para biomassa. Omori & Ikeda (1984) afirmam que alguns organismos
487 exclusivamente holoplanctônicos, como no caso dos Copepoda, costumam ser os mais
488 representativos para a biomassa em regiões costeiras. Entretanto, outros organismos,
489 principalmente os de maiores dimensões corporais, como no caso dos crustáceos
490 decápodes e larvas de peixes, como no atual estudo, chegam a contribuir com até 90% da

491 biomassa zooplanctônica costeira (Anger 2001). Ainda segundo Omori & Ikeda (1992) a
492 principal importância de se conhecer a biomassa zooplanctônica é para determinar a
493 produção e as condições nutricionais de uma espécie, assim como seu papel na cadeia
494 alimentar.

495 4.4 – Contribuição larval dos camarões escavadores e fatores ambientais

496 É de se chamar atenção que, dentre as larvas dos camarões escavadores, a
497 infraordem Gebiidea foi a mais representativa em relação a densidade. As larvas de
498 *Axianassa australis* representaram 86% de todas as larvas dos camarões escavadores e
499 em relação aos 17 taxa encontrados nesse estudo, foi o sétimo táxon com maior
500 densidade. As larvas de *Upogebia* sp., *Callichirus corruptus* (Z1 e Z2), *Lepidophthalmus*
501 *siriboia* e *Neocallichirus* sp. foram as que menos contribuíram na densidade geral.
502 Rodrigues-Inoue et al. (2021) em sua pesquisa na plataforma amazônica, registraram
503 larvas de diversas espécies dos camarões escavadores, incluindo as do gênero *Axianassa*,
504 *Upogebia*, *Callichirus* e *Neocallichirus*, todas em baixas densidades (0,01 a 1
505 ind./100m³). Enquanto que Schwamborn et al. (1999, 2001) e Melo Júnior et al. (2016)
506 encontraram larvas da família Upogebiidae em quantidades mais elevadas estando entre
507 as mais abundantes em regiões estuarinas próximas à costa. As grandes densidades e
508 abundância dessas famílias encontradas, reforçam a ideia de que as famílias Axianassidae
509 e Upobiidae possuem maior tempo larval no zooplâncton em relação as larvas da família
510 Callichiridae encontrados nesse estudo.

511 Não foi possível detectar diferenças entre a densidade larval dos camarões
512 escavadores com nenhum dos fatores abióticos (pH, temperatura e salinidade) estudados
513 entre os locais de coleta. Apesar disso, as larvas de *Axianassa australis* se sobressaíram
514 entre as demais, tanto no que diz respeito aos locais de coleta, quanto ao longo dos eventos

515 de seca e chuvas. Oliveira et al. (2012b) também não encontraram correlações entre a
516 densidade das larvas de *Lepidophthalmus siriboia*, entre os períodos de estudo, nem entre
517 os fatores ambientais. Ao estudarem as larvas planctônicas de Porcellanidae numa região
518 estuarina do Espírito Santo, Magris & Fernandes (2005) também não encontraram
519 relações entre a abundância dessas larvas e os fatores abióticos, como a salinidade, por
520 exemplo. Para o presente estudo, tais resultados podem ser decorrentes do curto período
521 de amostragem, não alcançado as variações abióticas influenciadas pela mudança sazonal,
522 apenas variações pontuais por eventos de amostragem.

523 A expressiva presença das larvas de *Axianassa austrais* e de *Upogebia* sp. tanto
524 entre os locais de coleta, quanto durante os eventos de amostragem de estiagem e chuvoso
525 pode ser um indicio de que essas larvas estão contribuindo no zooplâncton costeiro de
526 maneira contínua, devido aos eventos de reprodução, assim como encontrado por Oliveira
527 et al. (2012b) registrando que *U. vasquezi* Ngoc-Ho, 1989 possui o período produtivo
528 contínuo. Diferente do que foi registrado para os Callichiridae. As larvas de *Callichirus*
529 *corruptus* estiveram ausentes da região da pluma estuarina e dos eventos chuvosos. Larvas
530 de *Lepidophthalmus siriboia* não ocorreram na porção norte, na pluma estuarina, nem no
531 evento chuvoso e por fim, as larvas de *Neocallichirus* sp. não aconteceram apenas na
532 porção norte.

533 As maiores densidades, abundância e prevalência dessas larvas na porção sul e
534 durante os eventos de seca, demonstram uma tendência de exportação larval em direção
535 a ambientes mais salinos, que apesar de não ter demonstrado grandes variações nos
536 parâmetros ambientais, foram os que apresentaram os maiores valores de salinidade. É
537 comum observar em decápodes um comportamento de migração em seus estágios iniciais
538 de vida para diferentes corpos d'água em relação a variação das condições ambientais

539 ideais, como por exemplo a salinidade; para alcançar o sucesso do seu desenvolvimento
540 (O'Connor & Epifanio 1985).

541 Ao estudarem Brachyura dos gêneros *Ucides* e *Uca*, Smith & Diele (2008) e Smith
542 et al. (2014), registraram que ocorre exportação larval para esses indivíduos, uma vez que
543 esses organismos quando adultos habitam estuários e manguezais e diferentes fases de
544 desenvolvimento de suas larvas foram encontrados em águas costeiras, com salinidades
545 mais elevadas. Em camarões escavadores, esse mesmo padrão pôde ser observado,
546 principalmente, para ao gênero *Upogebia*. Pires et al. (2013) e Oliveira et al. (2016) ao
547 observarem as estratégias reprodutivas para *U. deltaura* (Leach, 1985) e *U. vasquezii*,
548 respectivamente, confirmam que ambas as espécies também exportam suas larvas das
549 regiões estuarinas para águas mais costeiras, de maneira que as larvas migrem
550 verticalmente para a superfície, onde ocorre maior potencial de dispersão. Pode-se então
551 levar em consideração que as larvas dos camarões escavadores de origem estuarina, como
552 as de *Axianassa australis* e *Upogebia* sp. tornam-se mais representativas em águas
553 costeiras em relação as larvas das espécies que habitam as regiões de praia, devido ao
554 percurso percorrido durante o processo de migração dessas larvas.

555 Tendo em vista os aspectos observados, é possível notar que a distribuição das
556 larvas dos camarões escavadores está associada ao comportamento de exportação e/ou
557 retenção larval. Além de ressaltar a importância do ambiente estuarino como fornecedor
558 dessas larvas para áreas costeiras adjacentes, onde elas tornam-se mais representativas.
559 Apesar dos estudos virem crescendo, o conhecimento sobre a ecologia dos camarões
560 escavadores ainda é pouco, principalmente no que diz respeito ao seu hábitat natural.
561 Então, as informações trazidas neste trabalho, contribuem para o conhecimento da
562 história de vida desses animais.

563 5 - CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

564 Marcos Antonio Lima Matoso: Coleta, triagem e identificação dos organismos, redação
565 do texto original, revisão e edição. Mônica Lúcia Botter-Carvalho: Análise estatística dos
566 dados e revisão do texto. Mauro de Melo Júnior: Supervisão e revisão geral do texto.

567 6 - AGRADECIMENTOS

568 Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
569 (CAPES) pela concessão da bolsa de número 88887.486849/2020-00, por meio do
570 Programa de Demanda Social. E a todos que contribuíram direta ou indiretamente para a
571 concepção deste trabalho.

572 7 – REFERÊNCIAS

573 ABRUNHOSA FA, PIRES MAB, LIMA JDF & COELHO-FILHO PA. 2005. Larval
574 development of *Lepidophthalmus siriboia* Felder & Rodrigues, 1993 (Decapoda:
575 Thalassinidea) from the Amazon region, reared in the laboratory. Acta Amazonica. 35:
576 77-84.

577 ALVES-JÚNIOR FA, ARAUJO MSLC & COELHO PA. 2014. Population biology of
578 *Callichirus corruptus* (Say, 1818) (Crustacea: Callinassidae) at Piedade Beach, Brazil.
579 Revista da Gestão Costeira Integrada/ J Integr Coast Zone Manag. 14, 1: 109-118.

580 ANDERSON MJ & WALSH DC. 2013. PERMANOVA, ANOSIM, and the Mantel test
581 in the face of heterogeneous dispersions: what null hypothesis are you
582 testing?. Ecological monographs. 83, 4: 557-574.

583 ANGER, K. 2001 The biology of decapod crustacean larvae. Lisse: AA Balkema
584 Publishers.

- 585 ARAGÃO JOR. 1998. O impacto do Enso e do Dipolo do Atlântico no Nordeste do
586 Brasil. Bull Inst Fr Andin. 27, 3: 839-844.
- 587 ARAÚJO HMP; 1996. Zooplâncton do estuário dos rios Piauí e Fundo (Sergipe, Brasil):
588 flutuações espaciais, sazonais e tidais. Tese de doutorado – Universidade Federal do
589 Paraná, 193 p.
- 590 BERKENBUSCH C & ROWDEN AA. 1998. Population dynamics of the burrowing
591 ghost shrimp *Callinassa filholi* on an intertidal sandflat in the New Zealand. Ophelia. 9:
592 55-69.
- 593 BOTTER-CARVALHO ML, SANTOS PJP & CARVALHO PVVC. 2007. Population
594 dynamics of *Callichirus corruptus* (Say, 1818) (Crustacea, Thalassinidea) on a beach in
595 northeastern Brazil. Estua Coast Shelf Sci. 71, 3: 508-516.
- 596 BOTTER-CARVALHO ML, COSTA LB, GOMES LL, CLEMENTE CCC, &
597 CARVALHO PDC. 2015. Reproductive biology and population structure of *Axianassa*
598 *australis* (Crustacea, Axianassidae) on a sand-mud flat in north-eastern Brazil. Jl Mar
599 Bioll Assoc UK. 95, 4: 735-745.
- 600 CARVALHO ACO, MARINS RV, DIAS FJS, REZENDE CE, LEFÈVRE N,
601 CAVALCANTE MS & ESCHRIQUE SA. 2017. Air-sea CO₂ fluxes for the Brazilian
602 northeast continental shelf in a climatic transition region. J Mar Sci, 173: 70–80.
- 603 CARVALHO ASS, NEVIS AB, OLIVEIRA DB & MARTINELLI-LEMOS JM. 2013.
604 Abundância das larvas de Porcellanidae (Decapoda, Anomura) no meroplâncton do
605 estuário do Rio Caeté, estuário amazônico brasileiro. Braz J Aquat Sci Tech, 17: 7-15.
- 606 CASTRO BM, LORENZZETTI JA, SILVEIRA ICA & MIRANDA LB. 2006. Estrutura
607 termohalina e circulação na região entre o Cabo de São Tomé (RJ) e o Chuí (RS). In:
608 ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C.L.B.; MADUREIRA, L.S.P. (Eds.), O ambiente

- 609 oceanográfico da plataforma continental e do talude na região Sudeste-Sul do Brasil.
610 Editora da Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 11–120.
- 611 COBO VJ. 2002. Breeding period of the spider crab *Mithraculus forceps* (A. Milne
612 Edwards) (Crustacea, Majidae, Mithracinae) in the southeastern Brazilian coast. Rev Bras
613 Zool. 19: 229-234.
- 614 COELHO PA. 1997. Revisão das espécies de Thalassinidea encontradas em Pernambuco,
615 Brasil (Crustacea, Decapoda). Trabalhos Oceanográficos da Universidade Federal de
616 Pernambuco, 25: 137-161.
- 617 COELHO VR, COOPER RA, & DE ALMEIDA RODRIGUES S. (2000). Burrow
618 morphology and behavior of the mud shrimp *Upogebia omissa* (Decapoda: Thalassinidea:
619 Upogebiidae). Mar Ecol Prog Ser. 200: 229-240.
- 620 DAJOZ, R. 1983. Ecologia Geral: Vozes Petrópolis.
- 621 DÍAZ-FERGUSON E & VARGAS-ZAMORA JA. 2001. Abundance of *Petrolisthes*
622 *armatus* (Crustacea: Porcellanidae) on a tropical estuarine intertidal rocky beach, Gulf of
623 Nicoya estuary, Costa Rica. R Biol Tropic, 97-101.
- 624 DWORSCHAK PC, & RODRIGUES SDA. 1997. A modern analogue for the trace fossil
625 Gyrolithes: burrows of the thalassinidean shrimp *Axianassa australis*. Lethaia. 30,1: 41-
626 52.
- 627 DWORSCHAK PC. 2005. Global diversity in the Thalassinidea (Decapoda): an update
628 (1998– 2004). Nauplius, 13: 57-63.
- 629 DWORSCHAK PETER C, FELDER DARRYL L & TUDGE CC. 2012. Infraorders
630 Axiidea de Saint Laurent, 1979 and Gebiidea de Saint Laurent, 1979 (formerly known
631 collectively as Thalassinidea). In: Treatise on Zoology-Anatomy, Taxonomy, Biology.
632 The Crustacea, 9: 109-219.

- 633 FELDER, DL. 2001. Diversity and ecological significance of deep-burrowing
634 macrocrustaceans in coastal tropical waters of the Americas (Decapoda: Thalassinidea).
635 Interciencia 26: 440-449
- 636 FRENCH P. 1997. Coastal and Estuarine Management (1st ed.). Routledge. 268 p.
- 637 FRIEDRICHS M, LEIPE T, PEINE F & GRAF G. 2009. Impact of macrozoobenthic
638 structures on near-bed sediment fluxes. J. Mar Syst. 75: 336-347.
- 639 GEBAUER P, PASCHKE K & ANGER KLAUS. 2010. Seasonal variation in the
640 nutritional vulnerability of first-stage larval porcelain crab, *Petrolisthes laevigatus*
641 (Anomura: Porcellanidae) in southern Chile. J Exp Mar Biol Ecol. 386, 1-2: 103-112.
- 642 GRECO CKS, FEITOSA FAN, HONORATO DA SILVA M, FLORES MONTES MJ.
643 2004. Distribuição espacial e sazonal da clorofila α fitoplanctônica e hidrologia do estuário
644 do rio Timbó (Paulista – PE). Tropic Ocean. 32, 2: 181-199.
- 645 HAMILTON L S & SNEDAKER SC. 1984. Handbook for mangrove area management.
646 Honolulu: East-West Environ and Poli Insti. 162 p.
- 647 HERNÁNDEZ P & WEHRTMANN IS. 2007. Population biology of the burrowing shrimp
648 *Callichirus seilacheri* (Decapoda: Callianassidae) in northern Chile. R Biol Tropic.
649 55:141-152.
- 650 HERNÁNDEZ P, PALMA S & WHERTANN IS. 2008. Egg production of the burrowing
651 shrimp *Callichirus seilacheri* (Bott, 1955) (Decapoda, Callianassidae) in northern Chile.
652 Helgol Mar Res. 62: 351-346.
- 653 HERNÁNDEZ P. 2018. An update on reproduction in ghost shrimps (Decapoda: Axiidea)
654 and mud lobsters (Decapoda: Gebiidea). Türkoğlu M., Önal U, Ismen A. Mar Ecol,
655 IntechOpen, 231-253.

- 656 KOETTKER AG & FREIRE AS. 2006. Spatial and temporal distribution of decapod
657 larvae in the subtropical waters of the Arvoredo archipelago, SC, Brazil. *Iheringia. Série*
658 *Zoologia*. 96: 31-40.
- 659 KRISTENSEN E, PENHA-LOPES G, DELEFOSSE M, VALDEMARSEN T,
660 QUINTANA CO & BANTA GT. 2012. What is bioturbation? The need for a precise
661 definition for fauna in aquatic sciences. *Mar Ecol Prog Ser*, 446: 285-302.
- 662 MAGRIS RA & FERNANDES LL. 2005. Levantamento preliminar das larvas de
663 Porcellanidae (Decapoda, Anomura) do sistema estuarino dos rios Piraquê-açú e Piraquê-
664 mirim, Aracruz, Espírito Santo. *Braz J Aqua Sci Tech*. 9, 1: 49-54.
- 665 MAGRIS RA, LOUREIRO-FERNANDES LF. 2011. Diversity and distribution of
666 assemblages of estuarine decapod larvae (Crustacea: Decapoda: Anomura, Brachyura) in
667 tropical southeastern Brazil. *Zootaxa*. 2758, 1: 26-42.
- 668 MELO JÚNIOR M, DE CASTRO MELO PAM, PARANAGUÁ MN, NEUMANN-
669 LEITÃO S & SCHWAMBORN R. 2016. Composition of decapod larvae in a
670 northeastern Brazilian estuarine inlet over a full tidal cycle. *Lat Sou J Aqua Res.*, 44, 2:
671 401-410.
- 672 MIRANDA LB, CASTRO BM & KJERFVE B. 2002. *Princípios de Oceanografia a*
673 *Física de Estuários*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
- 674 MORGADO FM, PASTORINHO R, QUINTANEIRO C & RÉ P. 2006. Vertical
675 distribution and trophic structure of the macrozooplankton in a shallow temperate estuary
676 (Ria de Aveiro, Portugal). *Sci Mar*. 70, 2: 177-188.
- 677 MUEHE, D. 1998 Estado morfodinâmico praiial no instante da observação: uma
678 alternativa de identificação. *Rev Bra Ocean*, 46: 157-169.
- 679 MUEHE D. 1999. O litoral brasileiro e sua compartimentação. *Geomorfologia do Brasil*
680 2: 273-349.

- 681 NASCIMENTO-VIEIRA DA & SANT'ANNA EME. 1989. Composição do Zooplâncton
682 no Estuário do Rio Timbó (Pernambuco – Brasil). Trabalhos Oceanográficos da
683 Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 20:77-97.
- 684 NEUMANN-LEITÃO S. 1994. Impactos antrópicos na comunidade zooplanctônica
685 estuarina. Porto de Suape-PE-Brasil. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos.
686 Tese de Doutorado. 273 p.
- 687 NIMER E. 1979. Um modelo metodológico de classificação de climas. R Bras Geogr. 41,
688 4: 59-89.
- 689 NGOC-HO N. 1981. A taxonomic study of the larvae of four thalassinid species
690 (Decapoda, Thalassinidea) from the Gulf of Mexico. Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Zool.). 40,
691 5: 237-273.
- 692 O'CONNOR NJ & EPIFANI, CE. 1985. The effect of salinity on the dispersal and
693 recruitment of fiddler crab larvae. J Crusta Biol. 5, 1: 137-145.
- 694 OMORI M & IKEDA. 1984. Methods in Marine Zooplankton Ecology. John Wiley &
695 Sons, New York, 332 p.
- 696 OMORI M & IKEDA T. 1992. Methods in marine zooplankton ecology. Krieger
697 Publishing Company, Malabar.
- 698 PAULA J, MENDES RN, PACI S, MCLAUGHLIN P, GHERARDI F & EMMERSON
699 W. 2001. Combined effects of temperature and salinity on the larval development of the
700 estuarine mud prawn *Upogebia africana* (Crustacea, Thalassinidea). In Advances in
701 decapod crustacean research. Springer, Dordrecht. 449: 141-148.
- 702 OLIVEIRA DB, MARTINELLI JM, & ABRUNHOSA FA. 2012a. Description of early
703 larval stages of *Upogebia vasquezii* (Gebiidea: Upogebiidae) reared in laboratory. J Mar
704 Biol Assoc. UK. 92, 2: 335-342.

- 705 OLIVEIRA DB, SILVA DC & MARTINELLI JM. 2012b. Density of larval and adult
706 forms of the burrowing crustaceans *Lepidophthalmus siriboia* (Callianassidae) and
707 *Upogebia vasquezi* (Upogebiidae) in an Amazon estuary, northern Brazil. J Mar Biol
708 Associ UK. 92, 2: 295-303.
- 709 OLIVEIRA D B, MARTINELLI-LEMOES J M, DE SOUZA A S, DA COSTA J R &
710 ABRUNHOSA, F. A. 2016. Does retention or exportation occur in the larvae of the mud
711 shrimp *Upogebia vasquezi* (Decapoda, Gebiidea)? Implications for the reproductive
712 strategy of the species on the Amazon coast. Hydrobiologia. 773, 1: 241-252.
- 713 PEIRÓ DF, WEHRTMANN IS, MANTELATTO FL. 2014. Reproductive strategy of
714 phantom prawn *Callichirus major* (Crustacea: Axiidea: Callianassidae) of the Southwest
715 Atlantic: female sexual maturity, fecundity, characteristics and reproductive output;
716 Invertebr Reprod Dev, 33 p.
- 717 PIRES RF, PAN M, SANTOS AMP, PELIZ Á, BOUTOV D, & DOS SANTOS A. 2013.
718 Modelling the variation in larval dispersal of estuarine and coastal ghost shrimp:
719 *Upogebia* congeners in the Gulf of Cadiz. Mar Ecol Prog Ser. 492: 153-168.
- 720 POHLE G, SANTANA W, JANSEN G, & GREWNLAW M. 2011. Plankton-Caught
721 Zoeal stages and megalopa of the lobster shrimp *Axius serratus* (Decapoda: Axiidae) from
722 the Bay of Fundy, Canada, with a summary of axiidean and gebiidean literature on larval
723 descriptions. J Crust Biol. 3, 1: 82-99.
- 724 POHLE G, SANTANA W, MARTIN JW, OLESEN J & HØEG JT. 2014. Gebiidea and
725 Axiidea (= Thalassinidea). Atlas of Crustacean Larvae, 263-271.
- 726 PRITCHARD DW. 1967. What is an estuary: Physical viewpoint. In: G. H. Lauf (ed).
727 Estuaries. Washington, 83: 3-5.

- 728 ROCHA LEITE N, PEREIRA LCC & DA COSTA RM. (2009). Distribuição temporal do
729 mesozooplâncton no furo Muriá, Pará, Brasil. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi-
730 Ciências Naturais. 4, 2: 149-164.
- 731 RODRIGUES SA. 1976 Sobre a reprodução, embriologia e desenvolvimento larval de
732 *Callichirus major* (Say 1818) (Crustacea, Decapoda, Thalassinidea). Bol Zool USP. 1: 85-
733 104.
- 734 RODRIGUES SA & SHIMIZU RM. 1997. Autoecologia de *Callichirus major* (Say, 1818)
735 (Crustacea: Decapoda: Thalassinidea). In: Absalão, R.S.; Esteves, A.M. (Eds.). Ecologia
736 de Praias Arenosas do Litoral Brasileiro Rio de Janeiro. Oecologia Brasiliensis. 3: 155-
737 170.
- 738 RODRIGUES-INOUE ACM, DOS SANTOS A & MARTINELLI-LEMONS JM. 2021.
739 Distribution patterns of Anomura, Axiidea and Gebiidea (Crustacea, Decapoda) larvae at
740 the Amazon shelf. Regional Studies in Marine Science, 47: 101946.
- 741 ROSA FILHO JS, GIRARD TC, & FRÉDOU FL. 2013. Population dynamics of the
742 burrowing shrimp *Lepidophthalmus siriboia* Felder and Rodrigues, 1993 (Reptantia:
743 Axiidea: Callianassidae) on the Amazonian coast. J Crust. Biol. 33, 4: 503-511.
- 744 RUPPERT EE, FOX RS & BARNES RD. 2005. Zoologia dos Invertebrados. 7ª ed., Ed.
745 Roca, São Paulo, 1145 p.
- 746 SAKAI K. 2014. On emphasizing the stabilization of the names of the infraorders of ghost
747 shrimps, Thalassinidea Latreille, 1831 and Callianassidea Dana, 1852 (Decapoda,
748 Pleocyemata). Crustaceana. 87, 4: 1738-1741.
- 749 SANT'ANNA EME, & TUNDISI JG. 1993. Estrutura e Biomassa da comunidade
750 zooplanctônica da bacia do Pina (Pernambuco-Brasil), relacionadas com fatores
751 ambientais. Tese de Doutorado. 195 p.

- 752 SASTRY AN. 1983. Ecological aspects of reproduction, p.179-270. In: F.J. Vernberg &
753 W.B. Vernberg (Eds). The Biology of Crustacea. Environmental Adaptations. New York,
754 Academic Press, 471 p.
- 755 SCHWAMBORN R, EKAU W, SILVA AP, SILVA TA & SAINT-PAUL U. 1999. The
756 contribution of estuarine decapod larvae to marine zooplankton communities in North-
757 East Brazil. Arch Fish Mar Res. 47, 2-3: 167-182.
- 758 SCHWAMBORN R, NEUMANN-LEITÃO S, SILVA TA, SILVA AP, EKAU W &
759 SAINT-PAUL U. 2001. Distribution and dispersal of decapod crustacean larvae and other
760 zooplankton in the Itamaracá estuarine system, Brazil. Tropic Ocean. 29, 1: 1-18.
- 761 SIMITH DJB & DIELE K. 2008. O efeito da salinidade no desenvolvimento larval do
762 caranguejo-uçá, *Ucides cordatus* (Linnaeus, 1763) (Decapoda: Ocypodidae) no Norte do
763 Brasil. Acta Amazonica. 38, 2: 345–350.
- 764 SIMITH DJB, PIRES MAB, ABRUNHOSA FA, MACIEL CR & DIELE K. 2014. Is
765 larval dispersal a necessity for decapod crabs from the Amazon mangroves? Response
766 of *Uca rapax* zoeae to different salinities and comparison with sympatric species. J Exp
767 Mar Biol Ecol. 457: 22–30.
- 768 SODRÉ CFL, SILVA YJA & MONTEIRO IP. 2016. Acidificação dos Oceanos:
769 fenômeno, consequências e necessidades de uma governança ambiental global. R Cien
770 Cent Estu Desenvol Susten da UNB. 1, 4.
- 771 STRASSER KM & FELDER DL. 1999. Larval development in two populations of the
772 ghost shrimp *Callichirus major* (Decapoda: Thalassinidea) under laboratory conditions. J
773 Crust Biol. 19, 4: 844-878.
- 774 STRASSER KM & FELDER DL. 2000. Larval development of the ghost shrimp
775 *Callichirus islagrande* (Decapoda: Thalassinidea: Callianassidae) under laboratory
776 conditions. J Crust Biol. 20, 1: 100-117.

- 777 STRASSER, K. M., & FELDER, D. L. 2005. Larval development of the mud shrimp
778 *Axianassa australis* (Decapoda: Thalassinidea) under laboratory conditions. J Nat
779 His. 39, 25: 2289-2306.
- 780 TAMAKI A, TANOUE H, ITOH J, & FUKUDA, Y. 1996. Brooding and larval
781 developmental periods of the callianassid ghost shrimp, *Callianassa japonica* (Decapoda:
782 Thalassinidea). J Mar Biolog Assoc UK. 76, 3: 675-689.
- 783 VAROLLI F M F. 1986. Aspectos da macroinfauna bentônica da região entremarés
784 arenosa da praia da enseada – Guarujá, São Paulo. Acta Biol Leop. 18, 2: 39-49.
- 785 WEBB A P & EYRE B D. 2004. Effects of natural populations burrowing thalassinidean
786 shrimp on sediment irrigatio benthic metabolism, nutrient fluxes and denitrificatio Mar
787 Ecol Prog Ser. 268: 20–220.
- 788 WITBAARD R & DUINEVELD GCA. 1989. Some aspects of the biology and ecology
789 of the burrowing shrimp *Callianassa subterranea* (Montagu)(Thalassinidea) from the
790 southern North Sea. Sarsia. 74, 3: 209-219.
- 791 WOOLDRIDGE TH & LOUBSER H. 1996. Larval release rhythms and tidal exchange
792 in the estuarine mudprawn, *Upogebia africana*. Hydrobiologia, 337, 1: 113-121.
- 793

794 **Figuras:**

795

796

797 Figura 1: Área do estudo: Complexo marinho-estuarino, localizado no litoral norte de Pernambuco, entre
 798 os municípios de Paulista e Igarassu, com os símbolos apresentando as estações de coleta do zooplâncton.:
 799 porção sul (PS); pluma estuarina (PE) e porção norte (PN). A Área destacada corresponde à praia de Mangue
 800 Seco, local onde foram coletadas as fêmeas ovíferas.

801

802

803 Figura 2: Valores médios dos parâmetros abióticos (pH, temperatura e salinidade) obtidos durante as coletas
804 na porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de seca (s)
805 e chuvosa (c), com seus respectivos desvios padrão.

806

807 Figura 3: Ordenação PCA envolvendo as variáveis ambientais (temperatura, salinidade, pH) com os locais
808 de coleta porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e com os eventos de amostragem seca
809 (s) e chuvosa (c).

810

811

812 Figura 4: Larvas dos camarões escavadores coletadas no estágio de zoea 1. a - *Callichirus*
 813 *corruptus*. b - *Lepidophthalmus siriboia*, c - *Neocallichirus* sp., d - *Axianassa Australis* e
 814 e - *Upogebia* sp.

815

816 Figura 5: Ordenação multidimensional não-métrica (MDS) com as densidades médias de larvas de Axiidea
 817 e Gebiidea em relação com os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE)
 818 e entre os eventos de amostragem de seca (s) e chuvosa (c).

819

820 Figura 6: Densidade média (ind./100m³) do zooplâncton e seus desvios padrão. a – Densidade média total
 821 para todo zooplâncton coletado. b – Comparação da densidade média das larvas dos camarões escavadores
 822 entre os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de
 823 amostragem de seca (s) e chuvosa (c).

824

825 Figura 7: Comparação da abundância relativa larval das espécies de camarões escavadores entre as locais
 826 de coleta porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e entre os eventos de amostragem de
 827 seca (s) e chuvosa (c)

828

829 Figura 8: Classificação dos taxa encontradas quanto à frequência de ocorrência (FrO %), seguindo o critério
 830 estabelecido onde FrO > 70% - Muito frequente; 70 | 40% -Frequente 40 | 20% - Pouco frequente (PA) e
 831 ≤ 20% - Raro.

832

833

834 Figura 9: Representação da frequência de ocorrência (FrO %) dos os estágios larvais dos camarões
 835 escavadores entre os locais de coleta: porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE), e entre os
 836 eventos de amostragem: seca (s) e chuvosa (c).

837

838 Figura 10: Contribuição do zooplâncton coletado para a biomassa total dos organismos, estimada através
 839 do peso úmido e expressa em mg/100m³.

840

841 Figura 11: Contribuição das larvas dos camarões escavadores com a biomassa (mg/100m³) local de Coleta:
 842 porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE), e entre os eventos de amostragem: seca (s) e
 843 chuvosa (c)..

844

845 Tabelas:

846 Tabela I: Dados hidrológicos do pH, Temperatura e Salinidade em cada estação de coleta, com o valor da
 847 média e desvio padrão amostral, onde porção sul (PS), porção norte (PN) e pluma estuarina (PE) e DP =
 848 Desvio Padrão.)

DATA	ESTAÇÃO	pH	Temperatura (°C)	Salinidade
	PS	7,6	28,7	30
27/02/2021	PN	7,7	29,4	32,4
	PE	7,6	29,6	31,8
	PS	6,5	28	33
27/04/2021	PN	6,5	29	31
	PE	7	28	30
27/05/2021	PS	7	27	30

	PN	7	28	32
	PE	7	27	30
	PS	6,5	26	31
23/06/2021	PN	6	26,5	32
	PE	7,5	27	30
	PS	6	26	32
26/07/2021	PN	6	28	31
	PE	7,5	24	30
	PS	7,5	28	34
23/09/2021	PN	7	29	31
	PE	7,5	28	33
	Média	7	28	31,4
	DP ±	0,6	1,4	1,3

849

850 Tabela II: Resultados da análise de componentes principais (PCA) das variáveis ambientais (pH,
851 temperatura e salinidade) medidas das estações de coleta em estudo e suas respectivas contribuições em
852 percentagem.

Variável	PC1	PC2	PC3	PC	Autovalor	Variação (%)	Variação acumulada (%)
pH	0,241	-0,868	0,434	1	1,38	45,9	45,9
Temperatura	0,795	-0,129	-0,665	2	1,09	36,2	82,1
Salinidade	0,633	0,479	0,608	3	0,539	17,9	100

853

854 Tabela III: Composição taxonômica e abundância relativa (AR-%) do zooplâncton entre as estações de
 855 coleta, PS = porção sul; PN = porção norte e PE = pluma estuarina. E entre eventos amostrais: s = seco, c
 856 = chuvoso; estágio de desenvolvimento larval para as Famílias Callichiridae e Upogebiidae e Axianassidae,
 857 de maneira que Zoea 1 (Z1) e Zoea 2 (Z2), e suas respectivas classificações quanto a abundância, onde >
 858 70% - Dominantes (DO); 70 - 40% - Abundantes (AB); 40 - 20% - Pouco abundante (PA) e ≤ 20% - Raro
 859 (RA).

Taxa	(AR-%) Total	Classificação	(AR-%) – PS	Classificação	(AR-%) – PN	Classificação	(AR-%) – PE	Classificação	(AR-%) – s	Classificação	(AR-%) – c	Classificação
CRUSTACEA												
Copepoda	69,214	AB	79,642	DO	30,955	PA	20,517	RA	45,308	AB	78,870	DO
Cirripedia (Nauplius)	4,821	RA	1,591	RA	30,067	PA	9,551	RA	3,990	RA	4,399	RA
Decapoda												
Brachyura (Zoea)	19,109	RA	12,727	RA	20,376	RA	59,063	AB	31,176	PA	11,811	RA
Porcellanidae (zoea)	0,121	RA	0,138	RA	0	RA	0,065	RA	0,239	RA	0,073	RA
Alphaeidae (zoea)	0,417	RA	0,354	RA	0,319	RA	0,862	RA	0,326	RA	0,453	RA
Axiidea												
Callichiridae												
<i>Callichirus corruptus</i> (Z1)	0,008	RA	0,008	RA	0,035	RA	0	RA	0,029	RA	0	RA
<i>Callichirus corruptus</i> (Z2)	0,002	RA	0,003	RA	0	RA	0	RA	0,007	RA	0	RA
<i>Lepidophthalmus siriboia</i> (Z1)	0,002	RA	0,003	RA	0	RA	0	RA	0,007	RA	0	RA
<i>Neocallichirus</i> sp. (Z1)	0,008	RA	0,005	RA	0	RA	0,033	RA	0,007	RA	0,009	RA

Gebiidea

Axianassidae

Axianassa australis
(Z1)

0,717 RA 0,774 RA 0,816 RA 0,309 RA 0,478 RA 0,813 RA

Upogebiidae

Upogebia sp. (Z1)

0,096 RA 0,105 RA 0,106 RA 0,033 RA 0,159 RA 0,070 RA

Luciferidae

1,181 RA 1,419 RA 0,106 RA 0,163 RA 3,411 RA 0,281 RA

Penaeidae

(Zoea)

0,183 RA 0 RA 0,106 RA 1,383 RA 0 RA 0,257 RA

Amphipoda

0,410 RA 0,246 RA 1,242 RA 1,074 RA 1,159 RA 0,108 RA

Chaetognatha

1,023 RA 1,135 RA 0,532 RA 0,537 RA 0,999 RA 1,302 RA

CHORDATA

Appendicularia

2,904 RA 1,788 RA 12,993 RA 5,369 RA 6,676 RA 1,381 RA

Teleostei (larva)

0,323 RA 0,064 RA 2,343 RA 1,041 RA 0,029 RA 0,442 RA

860

861 Tabela IV: Análise PERMANOVA a 2 fatores utilizando a densidade larval de Axiidea e Gebiidea. Fatores

862 fixos: estações de coleta (porção sul, porção norte e pluma estuarina) e, Período (seco e chuvoso). A análise

863 foi baseada na matriz de similaridade de Bray Curtis, transformada em $\text{Log}(x+1)$.

Fonte de variação	Df	SS	MS	Pseudo-F	P	Unique perms	P (MC)
Estação de coleta	2	4164.3	2082.2	1.3969	0.2338	9947	0.2687

Eventos de amostragem	1	986.38	986.38	0.66175	0.6234	9907	0.5686
Estação de coleta x Eventos de amostragem	2	746.19	373.09	0.25031	0.9161	9951	0.8993
Residual	6	8943.3	1490.6				
Total	11	15040					

864

865

866 Tabela V: Contribuição percentual (%) das espécies das larvas dos camarões escavadores para a
 867 similaridade (análise de SIMPER) dentro de cada grupo formado pelas estações de coleta (PN= porção
 868 norte; PS= porção sul e PE= pluma estuarina).

PS x PN δ média = 57.01					PS x PE δ média = 60.25					PN x PE δ média = 63.04				
Espécie	OS	PN	CONT%	CUM%	Espécie	OS	PE	CONT%	CUM%	Espécie	PN	PE	CONT%	CUM%
<i>Axianassa australis</i>	5.29	2.40	37.38	37.38	<i>Axianassa australis</i>	5.29	2.49	35.29	35.29	<i>Axianassa australis</i>	2.40	2.49	40.16	40.16
<i>Upogebia</i> sp	3.23	1.15	32.17	69.56	<i>Upogebia</i> sp	3.23	0.85	30.76	66.05	<i>Neocallichirus</i> sp	0.00	1.28	29.16	69.32
<i>Callichirus major</i> (Z1)	0.73	0.38	11.31	80.86	<i>Neocallichirus</i> sp	0.63	1.28	14.32	80.36	<i>Upogebia</i> sp	1.15	0.85	24.56	93.88

<i>Neocallichirus</i> sp	0.63	0.00	6.79	87.65	<i>Callichirus major</i> (Z1)	0.73	0.00	8.48	88.84
<i>Callichirus major</i> (Z2)	0.48	0.00	6.17	93.83	<i>Callichirus major</i> (Z2)	0.48	0.00	5.58	94.42

869

870

871 Tabela VI: Contribuição percentual (%) das espécies das larvas dos camarões escavadores para a
872 similaridade (análise de SIMPER) entre os eventos de amostragem de seca e chuvosa.

 Seca x chuvosa

 δ média = 55.43

Espécie	SECA	CHUVOSA	CONT%	CUM%
<i>Axianassa australis</i>	3.87	3.03	38.18	38.18
<i>Upogebia</i> sp	1.72	1.80	26.46	64.64
<i>Callichirus major</i> (Z1)	0.97	0.00	14.19	78.84

Neocallichirus sp 0.38 0.64 11.59 90.43

873

874 Tabela VII: Registro dos grupos dos taxa de camarões escavadores coletados durante o período de estudo

875 na praia de Mangue Seco, Igarassu. AR = Abundância relativa (%); FrO = Frequência de ocorrência (%) e

876 Class. = Classificação de ocorrência, onde: FrO > 70% - Muito frequente (MF); 70 - 40% -Frequente (F);

877 40 - 20% - Pouco frequente (PF) e ≤ 20% - Raro (R).

878

Taxa	mar/2021	jun/2021	jul/2021	set/2021	AR.	FrO	Class.
					(%)	(%)	
							879
<i>Callichirus</i>	1	0	0	0	1,3	25	PF
<i>major</i>							881
<i>Fragilianassa</i>	0	0	0	1	1,3	25	PF
<i>fragilis</i>							883
<i>Lepidophthalmus</i>	9	2	5	1	21,3	100	MF
<i>siriboia</i>							884
<i>Neocallichirus</i>	3	7	4	8	27,5	75	MF
<i>grandimana</i>							
<i>Neocallichirus</i>	5	4	8	5	27,5	100	MF
<i>maryae</i>							
<i>Neocallichirus</i>	1	1	1	3	7,5	100	MF
sp.							
<i>Upogebia</i> sp.	1	5	0	2	10	75	MF
<i>Outros</i>	0	1	2	0	3,8	50	F

886 Tabela VIII: Registro das fêmeas ovígeras coletadas na praia de Mangue Seco, durante os eventos de
 887 amostragem.

888

12/03/2021	Seco	Callichiridae	<i>Neocallichirus maryae</i>
12/03/2021	Seco	Callichiridae	<i>Neocallichirus maryae</i>
12/03/20 21	Seco	Callichiridae	<i>Callichirus major</i>
26/06/2021	Chuvoso	Upogebiidae	<i>Upogebia</i> sp.
26/06/2021	Chuvoso	Callichiridae	<i>Neocallichirus grandimana</i>
26/06/2021	Chuvoso	Callichiridae	<i>Lepidophthalmus siriboia</i>
26/06/2021	Chuvoso	Callichiridae	<i>Lepidophthalmus siriboia</i>
23/09/2021	Seco	Upogebiidae	<i>Upogebia</i> sp.
23/09/2021	Seco	Callichiridae	<i>Neocallichirus grandimana</i>